

19
kreditov



SK SaPA

Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL
a
SLOVENSKÁ KOMORA
SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

**Vás pozýva na najväčšie odborné podujatie
všeobecných lekárov na Slovensku**

41. výročnú konferenciu SSVPL

ON-LINE



14.– 17. október 2020

Prenos môžete sledovať na stránkach
www.ssvpl.sk a www.idl.sk

PROGRAM

ISBN 978-80-973666-2-9

POLOVIČNÁ OCHRANA NIE JE OCHRANA

KOMPLEXNÁ OCHRANA HYPERTONIKA S DYSGLIPIDÉMIOU¹⁻³

LIPERTANCE®

atorvastatín/perindoprilarginín/amlodipín

pred jedlom. Lipertance nie je vhodný na začiatok liečby. Ako sa vykladže zmena dávkovania, titrácia sa má vykonávať s jednotlivými zložkami. **Súbežné podávanie:** s dlhýmtrvájacím atorvastatínom alebo letemovom[®] nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 mg/deň. Používanie Lipertance sa neodporúča pri súbežnom podávaní letemovom[®] s cyklosporínom[®]. **Starší ľudia a pacienti so zlyhaním obličiek:** Časť monitorovanie kreatinínu a draslíka. **Klírens kreatinínu (CrCl) < 60 ml/min:** nevhodné. **Porucha funkcie pečene:** má sa používať s opatnosťou. Lipertance je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. **Pediatrická populácia:** nemá sa používať. **KONTRAINDIKÁCIE:** Precitlivosť na liečivo alebo na ktorýkoľvek iný inhibitor ACE, alebo deriváty dihydropyridínu, alebo statín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenie sérových transamináz prekrážajúce 3-násobok hornej hranice normálu, počas gravidity, počas dojčenia a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia (pozi časť GRAVIDITA[®] a LAKTÁCIA[®]), súbežné užívanie antivirotk proti hepatitíde typu C (glekaprevir/pibrentasviru[®], ťažká hypotenzia, šok (vrátane kardiogénneho šoku), obštrukcia priedok ľavej komory (napr. hypertrofia obštrukčná kardiomyopatia a vysoký stupeň aortálnej stenózy), hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu, anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorm ACE, hereditárny alebo idiopatický angioedém, súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m²) (pozi časť INTERAKCIE[®]), súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom (pozi časť UPOZORNENIA[®] a INTERAKCIE[®]), extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozi časť INTERAKCIE[®]), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozi časť UPOZORNENIA[®]). **UPOZORNENIA:** **Odobrené upozornenia a opatrenia pri používaní:** Vplyv na pečeň: testy funkcie pečene sa majú vykonávať pravidelne a v prípade zvýšenia hladín transamináz sa majú pacienti monitorovať až do odstránenia tohto zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov (sérové transaminázy prekrážajúce 3-násobok hornej hranice normálu) a u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Používať s opatnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene, ktorí konzumujú alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. **Vplyv na kostrový sval:** zastaviť liečbu, ak zvýšenie hladín kreatínínázy (CK) > 10 x ULN alebo ak sa objavila svalové symptómy so zvýšením CK hladín > 5 x ULN alebo pri podrození na rambdomyólyzu. S opatnosťou je potrebné postupovať, keď sa Lipertance používa s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, a tým riziko rambdomyólyzy, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, ketokonazol, letemovom[®], ritonavir[®]...). Riziko myopatie sa môže tiež zvýšiť pri súbežnom používaní gemfibrozilu a iných derivátov kyseliny fibrovej, antivirotk na liečbu hepatitídy typu C (HCV), entymozínu, niacínu alebo ezetimíbu[®]. **Súbežné podávanie s liekovými formami kyseliny fusidovej** na systémové použitie alebo v priebehu 7 dní od ukončenia liečby kyselinou fusidovou sa neodporúča. Pokiaľ je použité vyvinuté, má byť počas liečby kyselinou fusidovou liečba Lipertance prerušená. **Intersticiálne ochorenie pľúc:** ak je podotrožené, liečba sa má prerušiť. **Diabetes mellitus:** U diabetických pacientov sa má kontrolovať glykemie starostlivo monitorovať počas prvého mesiaca liečby. **Srdcové zlyhanie:** používať s opatnosťou. **Hypotenzia:** monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie (hypovolémia alebo závažná renín-dependentná hypertenzia) alebo so symptomatickým srdcovým zlyhaním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Predchodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši po zväčšení objemu. **Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofia kardiomyopatia:** používať s opatnosťou a pozi časť KONTRAINDIKÁCIE[®]. **Transplantácia obličiek:** nie sú súvislosti po nedávnej transplantácii. **Renovaskulárna hypertenzia:** zvýšené riziko hypotenzie alebo renálnej insuficencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky; liečebných ACE inhibítormi. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami séroveho kreatinínu) dôsledkom u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie. **Porucha funkcie obličiek:** monitorovať draslík a kreatínín, individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami sa odporúča, ak CrCl < 60 ml/min. U pacientov so stenózou renálnej artérie môže byť zvýšená hladina urey v krvi a kreatinínu; s renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficencie. Amlodipín sa môže používať v normálnych dávkach u pacientov so zlyhaním obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný. **Hemolyzovaní pacienti:** používať s opatnosťou. **Precitlivosť/Angioedém:** zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtna môže byť fatálny. Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému. Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užiti poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. **Súbežné používanie iných inhibítorm NEP (napr. rakaedotril) a inhibítorm ACE** môže takisto zvýšiť riziko angioedému. **Súbežné použitie inhibítorm mTOR:** zvýšené riziko angioedému. **Anafylaktoidné reakcie počas infúzie lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL):** zriedkavo, pacienti zaznamenali život ohrožujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne ukončiť liečbu pred aferezou. **Anafylaktoidné reakcie počas deszenzibilizácie:** dočasne ukončiť podávanie pred liečbu. Tieto reakcie sa po náhodnej opätovnej expozícii objavujú znova. **Neutropénia/lymfocytóza/Trombocytopenia/Anémia:** používať s najvyššou opatnosťou u pacientov s kolagenovým vaskulárnym ochorením, imunospresivnou liečbou, liečbou s alagurinomom alebo prokainamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov. **Rasa:** perindopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov iných rás. **Košeľ:** ustupuje po ukončení liečby. **Operácia/anestézia:** zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. **Hyperkalémia:** časť monitorovanie draslíka v krvi v prípade renálnej insuficencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, hydratacie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidozy a súbežného používania draslík šetriacich diuretik a doplnkov draslíka alebo solných náhrad s obsahom draslíka. **Kombinácia s litom:** neodporúča sa. **Diaľna inhibícia systému renin-angiotenzín-aldosterón (RAAS):** súbežné použitie inhibítorm ACE, blokátorm receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkalémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Diaľna inhibícia RAAS sa preto neodporúča. **Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II** sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou. **Primárny aldosteronizmus:** užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renin-angiotenzínového systému). **Galaktózová intolerancia/galaktóza-galaktóza malabsorpcia/celkový deficit laktázy:** nemá sa užívať. **Sodík:** zanedbateľné množstvo sodíka. **INTERAKCIE:** **Kontraindikované:** aliskiren (u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek), extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan, glekaprevir/pibrentasviru[®]. **Neodporúča sa:** silné inhibítory CYP3A4, aliskiren, súčasná liečba s inhibítormi ACE a blokátorm receptora angiotenzínu, estramustín, lítium, kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid, eplerenón, spironolón), soli draslíka, dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. **S opatnosťou:** inductory CYP3A4, digoxín, ezetimib, kyselina fusidová, gemfibrozil/deriváty kyseliny fibrovej, inhibítory transportérov, warfarín, antiobediaká (inzulíny, perorálne antiobediaká), baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (vrátane aspirínu \geq 3 g/deň), rakaedotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus), kolchicín, kolestipol, perorálna antikoncepcia, giplytín (linagliptín), saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), sympatomimetiká, trikycklé antidepressíva/antipsychotiká/anestetiká, zlato, digoxín, atorvastatín, warfarín alebo cyklosporín, takrolimus, antihypertenzíva a vazodilatácia. **GRAVIDITA A LAKTÁCIA:** Lipertance je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. **FERTILITA:** Reverzibilné biochemické zmeny a narušenia u niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanálu. **OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE:** Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená v prípade závratu, bolesti hlavy, únavy, slabosti a nauzey. Opatnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby. **NEZÁDUCIE ÚČINKY:** Veľmi časté: edém. Časté: nasofaryngitída, hypersenzitívna pneumónia, hyperglykémia, somnolencia, závrat, bolesť hlavy, dyspnoe, paréza, vertigo, porucha zraku, diplopia, imitus, palpitácie, hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), sčervenanie, faryngolaryngálna bolesť, epistaxa, kašeľ, dyspnoe, nauzea, vrzanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, dyspepsia, hnačka, zápcha, zmenená činnosť čriev, flatulencia, vyrážka, pruritus, opuch kĺbov, opuch členka, bolesť v končatine, artalgia, svalové spazmy, myalgia, bolesť chrbta, asténia, únava, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hladina kreatínínázy v krvi. **Menej časté:** rinítida, ezozinifília, hypoglykémia, hyponatriémia, hyperkalémia reverzibilná po ukončení liečby, anorexia, insómnia, zmenená náhoda (vrátane úzkosti), porucha spánku, depresia, nočné mory, tremor, synkopa, hypostézia, amnézia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atrálnej fibrilácie), rozmazané videnie, tachykardia, vaskulitída, bronchospazmus, sucho v ústach, pankreatitída, erukácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, exantém, alopecia, angioedém, pemfigoid, fotosenzitívne reakcie, bolesť krku, svalová únava, porucha močenia, noktúria, polakizácia, zlyhanie obličiek, erukálna dysfunkcia, gynecomatia, bolesť na hrudi, bolesť, malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, zvýšené telesné hmotnosť, zvýšené telesné hmotnosť, zvýšené telesné hmotnosť, závažná zmena zloženia tela, zriedkavo: myopatie, stav zmanenosti, periférna neuropatia, cholelitiáza, zlyhanie kalčových kámov, zlyhanie kalčových kámov, vstup kalčových kámov do hlavných solných srdeč a cieľ. **BALENIE:** 30 alebo 90 (3 balenia po 30) filmom obalených tabliet lieku Lipertance 10mg/5mg/5mg, 20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/10mg, 40mg/10mg/10mg. **DÁTUM REVIZIE TEXTU:** 05/2020. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Prázdiesňoborstvo Farmaceuticne S.A., ul. Anpopl 68, 03-236 Varšava, Poľsko. Vydaj lieku je viazaný na lekárske predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. ^{*} Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690 ^{**} Vismňte si, prosím, zmenu v informácii o lieku
 Materiál je určený výlučne pre osoby oprávnené predpisovať alebo vydávať liek a bol pripravený v júni 2020. Pred prepísaním lieku si prosím pozorne preštudujte informáciu o lieku.

Literatúra: 1. Bertrand ME, Vlachopoulos C, Mourad J-J. Triple Combination Therapy for Global Cardiovascular Risk: Atorvastatin, Perindopril, and Amlodipine. Am J Cardiovasc Drugs. 2016;16(4):241–53. 2. Gupta AK, Poulter N, Arnti C on behalf of ASCOT-LLA investigators. Clinical efficacy of the combination of atorvastatin and perindopril in prevention of cardiovascular outcomes and mortality among high-risk hypertensive patients randomized to the ASCOT-LLA trial. EHJ. 2017;38:issue suppl_1:ehx493.5943. Available at: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx493.5943>. 3. A Gupta et al. Long-term mortality after blood pressure-lowering and lipid-lowering treatment in patients with hypertension in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) Legacy study: 16-year follow-up results of a randomised factorial trial. www.thelancet.com. Published online August 26, 2018.

SERVIER SLOVENSKO spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava,

tel.: +421 2 59 20 41 11, fax: +421 2 54 43 26 94

Obsah

PRÍHOVOR PREZIDENTA SSVPL	5
PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY SEKcie AMBULANTNÝCH SESTIER A PÔROBNÝCH ASISTENTIEK SK SAPA	7
VEDECKÝ ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONFERENCIE	10
KONTAKTY	11
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	13
PREHLADNÝ PROGRAM	16
ODBOBNÝ PROGRAM	22
ODBOBNÉ VZDELÁVANIE PRE SESTRY	36
POĎAKOVANIE SPONZOROM	44



Príhovor prezidenta SSVPL

„Trochu iné stretnutie“

Vážené kolegyně, vážení kolegovia,

s napätím sme očakávali aká farba nám naskočí na „kovidovom“ semafore, ktorý tak ako na cestách označuje bezpečnosť voľby...

Semafor sa však vypol úplne a vystriedal ho núdzový stav. Naraz sme však dokázali, že sa vieme dynamicky prispôbiť danej situácii a nájsť efektívne riešenie. A tak sa aj v tejto, pre všetkých, bezprecedentnej dobe vieme ako veľká rodina všeobecných lekárov stretnúť na našej plánovanej výročnej konferencii v on-line priestore. Nielen preto, aby sme sa vzdelávali, ale aj preto, aby sme sa podelili o skúsenosti a poznatky z posledných mesiacov, ktoré nás veľa naučili a preverili našu profesionalitu, schopnosti a odolnosť.

V boji s pandémiou nového koronavírusu všeobecní lekári svojim pacientom, ale aj celej spoločnosti dokázali, že primárna starostlivosť je vlajkovou loďou a základným pilierom zdravotníckeho systému našej krajiny.

A ak použijem paralelu k posádke vlajkovej lode, každý z nás ukázal, že vie, kde je na palube jeho miesto, že si vie očakávané úlohy plniť a v kritických momentoch nestráca ani rozvahu ani odvahu.

Boli ste to práve Vy, milí kolegovia, ktorí ste, aj napriek nepripravenosti ambulancií na danú situáciu a nejasnostiam či dynamike všeobecných usmernení, nezatvorili svoje ambulancie a v čase pandémie ste sa stali prvým bezpečným a upokojujúcim prístavom pre vystrašeného a zmäteného pacienta.

A pacienti, ako cestujúci na lodi, nás ako veliacich dôstojníkov na slovo počúvali. Dokonca nám dôverovali tak ako nikdy doteraz. A v prípade tejto pandémie nezlyhávalo ani riadenie z pevniny. Okrem spolupatričnosti a solidarity medzi lekármi pomáhala efektívne prispôbovať sa novej situácii a nastavovať nové pravidlá fungovania ambulancií aj príkladná komunikácia zo strany kompetentných subjektov. Aj naša Slovenská spoločnosť všeobecných lekárov stála pri Vás každý deň. Na našej stránke, aj prostredníctvom mailovej komunikácie sme zverejňovali aktuálne informácie, zintenzívnili sme komunikáciu s našimi členmi a výbor SSVPL aj v krízovom čase neustále intenzívne pracoval na presadzovaní lepších podmienok pre našu prácu, ktorá v konečnom dôsledku znamená najmä kvalitnejšiu starostlivosť o našich pacientov.

Vážené kolegyně, vážení kolegovia,

naše stretnutie bude síce iné, bez osobného kontaktu, ale vďaka priamemu prenosu z videoštúdií v Hoteli Bellevue v Tatrách, kde sa naše stretnutia už tradične konajú, budete s nami. Konferencia bude vysielaná v priamom prenose v pôvodnom termíne 15. – 17. októbra a o zaujímavý program rozhodne neprídete. Tento spôsob účasti na konferencii Vám umožní vybrať si z jej programu to, čo Vás zaujíma najviac, flexibilne sa presúvať v on-line priestore z jedného bloku programu do druhého, diskutovať alebo hlasovať a pozitívnu správou je, že lekári aj sestry budú mať podľa účasti na prednáškach zarátavané aj kredity.

Na najväčšom odbornom podujatí všeobecných lekárov Vás čaká skutočne atraktívny odborný program. Táto forma konferencie je pre mnohých z nás ďalšou výzvou, ale aj dôkazom adaptability a flexibility. Zažili sme to s čím sme v našej doterajšej praxi nemali žiadne skúsenosti. A obstáli sme. Ale stále sme pripravení prijímať nové výzvy. Aj v oblasti vzdelávania, ktoré posúva vpred nielen nás odborníkov primárnej sféry, ale pripravuje nás stále kvalitnejšie sa starať o našich pacientov. A v čase, ktorý nastal nás budú potrebovať nielen oni, ale aj celé zdravotníctvo oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Tak verím, že aj na našom „trochu inom stretnutí“ načerpáte nielen dostatok nových vedomostí, ale najmä podporu našej veľkej silnej a súdržnej rodiny – rodiny všeobecných praktických lekárov Slovenska.

MUDr. Peter Makara, MPH
prezident SSVPL



Príhovor prezidentky SK SaPA

Vážené kolegyně, kolegovia,

Odborná sekcia ambulancných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA Vás srdečne pozýva na XLI. Výročnú konferenciu SSVPL v on-line platforme.

Myšlienka ochrany verejného zdravia sa stala témou číslo jedna v celom spektre života. Ochorenie Covid-19 ovplyvnil a zmenil prácu v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých. Pribudli výkony ako telemedicína, telekonzultácia a do popredia sa dostal elektronický predpis receptov. Viac sa fokusuje na organizáciu práce a triáž pacientov. Je snahou obmedziť priamy kontakt s pacientom. Predpokladám, že z dlhodobého hľadiska to bude na škodu veci, hlavne v edukačnej činnosti sestier v ambulancnej sfére.

Dobrou správou však je čerstvá novinka od Občianskeho združenia Infodoktor v podobe odbornej publikácie určenej kompetentným zdravotníckym pracovníkom zaoberajúcim sa edukáciou dospelých pacientov s artériovou hypertenziou, fajčením tabaku, dyslipidemiou, nadhmotnosťou/obezitou, diabetes mellitus, nedostatočnou konzumáciou ovocia a zeleniny, nedostatočnou pohybovou aktivitou a rizikovou konzumáciou alkoholu. Každý uvedený rizikový faktor je vypracovaný z teoretického a praktického hľadiska. V knihe nájdete konkrétne príklady rozhovorov lekár – pacient a sestra – pacient.

Aj touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali pri tvorbe tejto odbornej publikácie a zdieľali svoje neoceniteľné vedomosti a skúsenosti. Verím, že táto publikácia bude podnetná pre našu každodennú prax.


Vopred ďakujem aktívnym účastníkom, ktorí aj napriek obmedzeniam si dávajú námahu a prispievajú k zvýšeniu úrovne tohto odborného podujatia v online platforme. Moje ďakujem patrí aj organizátorom, ktorí sa vynasili a dokázali sa prispôsobiť požiadavkám Úradu verejného zdravotníctva a vyhlásenému núdzovému stavu. Ešte raz veľká vďaka.

S pozdravom

PhDr. Zuzana Gavalierová
Predseda Odbornej sekcie ambulancných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA

Benfogamma® 300

Patogenetická liečba vaskulárnych komplikácií diabetu



- 300 mg benfotiamínu v jednej filmom obalenej tablete
- rozpustnosť benfotiamínu v tukoch oproti tiamínu prináša:



- 5-krát vyššiu inkorporáciu do svalu¹
- 25-krát vyššiu inkorporáciu do mozgu¹
- 10 – 40 % lepšiu inkorporáciu do pečene a obličiek¹

Skrátená informácia o lieku: Benfogamma® 300.

Liečivo a lieková forma: Filmom obalená tableta s deliacou ryhou obsahuje 300 mg benfotiamínu (derivát vitamínu B1 rozpustný v tukoch). **Terapeutické indikácie:** Liečba a prevencia klinických stavov spôsobených nedostatkom vitamínu B1, ak tieto stavy nie je možné upraviť diétnymi opatreniami. Klinicky diagnostikovaný nedostatok vitamínu B1 sa môže vyskytnúť pri: nedostatočnej výžive a malnutrii (napr. beri-beri), dlhobodej parenterálnej výžive, hladovaní, hemodialýze, malabsorpcii, chronickom alkoholizme (alkoholová toxická kardiomyopatia, Wernickeho encefalopatia, Korsakov syndróm), pri zvýšenej potrebe (napr. tehotenstvo a dojčenie). Liečba neuropatií a kardiovaskulárnych ochorení vyvolaných nedostatkom vitamínu B1. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Pokiaľ nie je predpísané inak, zvyčajná dávka je 1 filmom obalená tableta raz denne. Filmom obalené tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny. Dĺžka liečby závisí od terapeutickú odpovede. Pri liečbe neuropatií sa spočiatku užíva Benfogamma 300 aspoň 3 týždne. Následná udržiavacia liečba sa riadi podľa terapeutickú odpovede. V prípade chýbajúcej alebo nedostatočnej terapeutickú odpovede sa má liečba prerušiť. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Žiadne. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Odporúčaná denná dávka vitamínu B1 počas gravidity a laktácie je 1,4 – 1,6 mg. Počas gravidity a laktácie sa môže táto dávka prekročiť len vtedy, ak sa u pacientky dokáže deficit vitamínu B1, pretože dodnes nebola preukázaná bezpečnosť vyšších dávok, ako je odporúčaná denná dávka. Vitamín B1 prechádza do materskeho mlieka. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** Žiadne špeciálne opatrenia. **Nežiaduce účinky:** Pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Benfogamma® 300. **Druh obalu a obsah balenia:** PVC/PVDC/Al blister. Originálne balenie obsahuje 10, 30, 60 a 100 filmom obalených tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. **Registračné číslo:** 86/0089/11-S. **Dátum revízie textu:** 10/2017 **Spôsob výdaja:** Na lekársky predpis.

Pred predpísaním lieku si prečítajte, prosím, Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na www.sukl.sk.

Literatúra: 1. The EFSA Journal 2008; 864: 13-31.

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3, tel. 02/4488 9920, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk

BENFOINZ072020

Vedecký, organizačný výbor a sekretariát konferencie

Prezident konferencie

MUDr. Peter Makara, MPH

Prezident SSVPL

Organizačný výbor

MUDr. Peter Makara, MPH

prezident

MUDr. Michaela Macháčová

víceprezidentka

MUDr. Peter Pekarovič

vedecký sekretár

MUDr. Peter Lipták

riaditeľ sekretariátu

MUDr. Peter Lipovský

predseda mladých praktikov

Programový výbor konferencie

MUDr. Bachledová Stanislava

Doc. MUDr. Belovičová Mária, PhD. mim. prof.

MUDr. Bendová Jana, PhD.

MUDr. Blahová Beáta

MUDr. Dostálová Katarína, PhD., MPH

prof. MUDr. PhDr. Kalanin Peter, PhD

MUDr. Kaňuch Ján

MUDr. Lipovský Peter

MUDr. Lipták Peter

MUDr. Macháčová Michaela

MUDr. Makara Peter, MPH

MUDr. Matusová Mária

Doc. MUDr. Minárik Peter, PhD., MSc.

Doc. PharmDr. Mináriková Daniela, PhD., MSc.

MUDr. Ostrovská Soňa

MUDr. Pekarovič Peter

MUDr. Resutíková Ľudmila

MUDr. Straková Jana

MUDr. Šimková Adriana, PhD.

Kontakty

Odborný program:

MUDr. Peter Makara, MPH,

E-mail: peter.makara@gmail.com

MUDr. Michaela Macháčová

E-mail: machacova@ssvpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov:

MUDr. Jana Bendová

E-mail: bendova@ssvpl.sk

Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných ZZ

PhDr. Zuzana Gavalierová

E-mail: gavalierova.z@gmail.com

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie



I.D.L. Company s.r.o.

www.idl.sk

mobil: +421 918 569 890

Kontaktná osoba:

Marcela Idlbeková

mobil: +421 918 569 890

e-mail: marcela.idlbekova@idl.sk

Chcete byť informovaní
o odborných podujatiach?

Registrujte sa už teraz na www.idl.sk

Všeobecné informácie



**41. konferencia SSVPL
bude vysielaná v priamom
prenose z troch štúdií
v Hoteli Bellevue**

Kreditové hodnotenie

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK a SKSaPA.

Kredity budú lekárom a sestram pripisované automaticky.

Za každú hodinu sledovaného prenosu bude pridelený 1 kredit
v súlade s kreditovým hodnotením SLK a SKSaPA podľa platných predpisov.

Maximálny počet kreditov:

LEKÁRI

Štvrtok 15. 10. 2020	8 kreditov
Piatok 16. 10. 2020	8 kreditov
Sobota 17. 10. 2020	3 kredity

Aktívna účasť

Autor prednášky	10 kreditov
Prví dvaja spoluautori	5 kreditov

SESTRY

Štvrtok 15. 10. 2020	8 kreditov
Piatok 16. 10. 2020	8 kreditov
Sobota 17. 10. 2020	3 kredity

Aktívna účasť

Autor prednášky	10 kreditov
Prví dvaja spoluautori	5 kreditov

Registrácia

Aktívny účastník:

Aktívny účastník odovzdá svoju prezentáciu 30 min. pred začiatkom bloku v ktorom odznie jeho prednáška technikovi pred vstupom do konferenčného priestoru Hotela Bellevue.

Pasívny účastník

Registrácia prebieha na stránke www.idl.sk

Registračný poplatok za on line prenos:

15. 10. 2020 – štvrtok	20 Eur
16. 10. 2020 – piatok	20 Eur
17. 10. 2020 – sobota	10 Eur

Platba platobnou kartou priamo pri registrácii na prenos.

Možnosť fakturácie iba za trojdňový vstup, cena 50,- Eur.

Po uhradení registračného poplatku príde na mailovú adresu vami zadanú pri registrácii prístupový kód. **Kód je neprenosný.**

Registračný poplatok je nevratný.

Aktívny účastníci registračný poplatok nehradia.

STREDA 14. 10. 2020

Bellevue I	Bellevue II	Bellevue III
TECHNICKÁ PRÍPRAVA	TECHNICKÁ PRÍPRAVA	TECHNICKÁ PRÍPRAVA

ŠTVRTOK 15. 10. 2020

Sála	Bellevue I	Bellevue II	Bellevue III
8:00 – 9:00	ČO JE NOVÉ VO VYKAZOVANÍ VÝKONOV (WS)		
9:10 – 10:10	HLADÁM AMBULANCIU, HLADÁM NÁSLEDOVNÍKA, AKO NA TO	PREVENCIA A LIEČBA VYBRANÝCH PŔÚČNYCH OCHORENÍ UP TO DATE <i>Blok podporený spoločnosťou MSD</i>	CHRÁNITE SVOJICH PACIENTOV, CHRÁŇTE AJ SEBA <i>Blok podporený spoločnosťou RENOMIA</i>
10:20 – 11:20	ROZDIEL MEDZI TÝM ČO „MUSÍM“ A ČO „MŮŽEM“ <i>(zmeny v legislatíve a ohrozenia v praxi VLD)</i>	KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K TERAPII OBEZITY V ČESKÉ REPUBLICE	MODERNÁ MEDICÍNA - manažment pacienta na dialku s novými technológiami <i>Interaktívny diskusný blok</i>
11:30 – 11:50	SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE		
11:50 – 12:30	TÉMA REZEROVANÁ PRE MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR		
12:30 – 13:30	OBED		
13:30 – 14:30	AKO SPRÁVNE PRISTUPOVAŤ K LIEČBE VERTEBROGÉNNÝCH OCHORENÍ? <i>Blok podporený spoločnosťou KRKA</i>	DERMATOLOGICKÝ BLOK	DARCOVSKÝ A TRANSPLANTAČNÝ PROGRAM <i>Blok Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS</i>
14:40 – 15:40	VENŮŠIE OCHORENIA – KAŽDODENNÁ PRAX VŠEOBECNÉHO LÉKÁRA <i>Blok podporený spoločnosťou SERVIER Slovensko</i>	ZDRAVOTNÍCKE IT V TREŤOM TISÍČROČÍ Čo nám ukladá koronavírus a čo sme si musíme riešiť	VARIA
15:50-16:50	VIEME AKO ZABEZPEČIŤ SPRÁVNE FUNKOVANIE KVS SYSTÉMU? <i>Blok podporený spoločnosťou MYLAN</i>	VPLYV SPRÁVANIA NA ŽIVOTNÝ ŠTÝL A RIZIKÁ NÁDOROVÝCH CHORŮB	ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE
17:00 – 18:00	CHOROBY PEČENE A PRAKTIK <i>Blok Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS</i>	HIV AWARENESS PREDNÁŠKY <i>Blok podporený spoločnosťou GSK</i>	SPOLUPRÁCA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV VÚC (Združenie SK 8) s VLD <i>Blok VÚC</i>

Telidipin®
telmisartan/amlodipín

Wamlox®
amlodipín a valsartán


Valtricom®
amlodipín, valsartán a hydrochlorotiazid

Nalgessin®
naproxén sodný Forte

Skrátaná informácia o lieku:
Nalgessin Forte 550 mg, filmom obalená tableta obsahuje 550 mg soľnej soli naproxenu, čo zodpovedá 500 mg naproxenu. Pomocné látky: sodík 50,00 mg/tableta). **Terapeutické indikácie:** Nalgessin Forte lieči bolesť a znižuje horúčku. Používa sa na bolesť zblavy a hlavy, bolesti v svaloch, kĺboch a chrbte, prevenciu a liečbu migrénových porúch, zmenenie menštruačnej bolesti a kŕče, bolesť spôsobenú pri zavádzaní vnitromaternicového teliečka a inej bolesti, bolesť zubov, extra-artikulárny reumatizmus, infekčné ochorenia (zvlášť so ako prírodný liek s špecifickým účinkom na zmiernenie bolesti a zápalu a zmiernenie horúčky), neurologické ochorenia (spôsob protizápalovým a analgetickým účinkom pri reumatoidnej artritíde, chronickom jernom diopatičkej artritíde, artroze, ankylozujúcej spondylitíde a dnye). **Dávkovanie a spôsob podávania:** Dospelí: Zvyčajná denná dávka na zmiernenie bolesti je od 550 mg do 1 100 mg soľnej soli naproxenu. Úvodná dávka je 550 mg, nasledujúce dávky sú 275 mg každých 8 až 12 hodín. U pacientov, ktorí dobera tolerujú väčšie dávky a nemajú žiadne gastrointestinálne ochorenia, sa denná dávka môže zvýšiť na 1 650 mg pri silnej bolesti, ale nie na dlhšie ako 2 týždne. Tablety sa majú prehltnúť s tekutinou. **Doplnkové starosti ako 76 rokov:** Dávkovanie je rovnaké ako dávkovanie u dospelých. **Deti vo veku 2 až 16 rokov:** 10 mg/kg/dni užité v dvakrát v 12 hodinových intervaloch. Maximálna jednorazová dávka by v deti nemala presiahnuť 275 mg. **Deti vo veku do dvoch rokov:** Nalgessin Forte je kontraindikovaný u detí vo veku do dvoch rokov. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na sodnú soľ naproxenu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Precitlivosť na salsicyláty a ine nesteroidné protizápalové lieky určené na liečbu bronchiálnej astmy, urtikárie a rinítidy. Aktívny alebo rekurentný gastrický alebo duodenálny vred, gastrointestinálne krvácanie. Ťažká porucha pečene alebo obličiek. Závažné srdcové zlyhanie. Posledný trimester gravidity. Použíte u detí do 2 rokov. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Nežiaduce účinky sa môžu minimálne zvýšiť použitím najvyššej úložnej dávky počas najdlhšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu príznakov (sú a kardiovaskulárne riziko). **Liekové a iné interakcie:** Súčasné podávanie lysovej acetylsalicylickej a iných nesteroidných protizápalových liekov sa neodporúča, pretože to môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov. Sodná soľ naproxenu môže znižovať absorpciu kŕvných doštičiek a predlžovať krvácanie, čo sa má brať do úvahy pri súbežnej liečbe antikoagulanciami. Opatrnosť vzhľadom na zmiernenie bolesti spôsobujúce stratu vedomia. Nalgessin Forte nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. **Gravidita a laktácia:** Liek nedovoľuje počas gravidity len ak prímos pre matku vyšší ako riziko pre plod. Použíte Nalgessin Forte je kontraindikované počas posledného trimestra gravidity. Užívanie Nalgessin Forte sa neodporúča počas laktácie. **Nežiaduce účinky:** bolesť hlavy, tŕnenie hlavy, ospalosť, zápch, abdominálna bolesť, nauzea, dyspepsia, hnačka, stomatitída. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjevska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko. **Dátum revízie textu:** október 2019. Pred predpisovaním si prečítajte úplnú informáciu o lieku (SPC). Ktoe nájdete aj na adrese: Krka Slovensko s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Učtené pre odbornú verejnosť.

Telidipín 40 mg/5 mg tablety, Telidipín 40 mg/10 mg tablety, Telidipín 80 mg/5 mg tablety, Telidipín 80 mg/10 mg tablety. Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu alebo 10 mg/5 mg alebo 10 mg/10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat). **Terapeutické indikácie:** Telidipín je indikovaný ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie pacientom, ktorých krvný tlak je dostatočne kontrolovaný telmisartanom a amlodipínom podávanými súčasne v rovnakých dávkach ako sú v kombinácii. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Odporúčaná dávka Telidipínu je 1 tableta denne. Fara kombinácia dávok je vhodná na začiatku liečby. Telidipín sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Telidipín sa odporúča uživiť s dostatočným množstvom tekutiny. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liek alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Druhý a tretí trimester gravidity. Obštruktívne poruchy žlčových ciest. Ťažká porucha pečene pečene. Závažná hypotenzia. Sok (vrátane kardiogénneho šoku). Obštruktívna výtoková časť ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy). Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu. Súbežné užívanie Telidipínu s liekmi obsahujúcimi alkalické fosforylázy u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m²). **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Preskúvalo sa, že súčasné použitie inhibítora ACE, blokátora receptorov angiotenzínu II alebo diuretika zvyšuje riziko hypotenzie, hypokaliémie a zniženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Dvojnásobná dávka kombinovaným použitím inhibítora ACE, blokátora receptorov angiotenzínu II alebo aliskirínu a preto neodporúča. **Liekové a iné interakcie:** Liek ako iné lieky znižujúce na systém renin-angiotenzínového systému, telmisartan môže zvyšovať hypokaliémiu. Nižšie slobodného podávania lieku s inhibítormi angiotenzínového enzýmu a antagonizmi receptorov angiotenzínu II, vrátane telmisartanu, boli bližšie nevertebné zvýšenie sérových koncentrácií litia a toxická. Ak sa ukaže nevhodnosť použitia takejto kombinácie, odporúča sa dôkladné monitorovanie hladín litia v krvi. **Gravidita a laktácia:** Telidipín je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra gravidity a v období do dvoch rokov po ukončení gravidity. Keďže nie sú dostupné žiadne informácie o vplyvoch podávania amlodipínu alebo telmisartanu počas dojčenia, Telidipín sa neodporúča u dojčiacich matiek. **Bezpečnosť:** Účinnosť a bezpečnosť profarm bezpečnosti počas dojčenia, najmä počas dojčenia novorodencov alebo predčasne narodených detí. **Nežiaduce účinky:** filmotamir: zlyhanie zlyhanie reakcie zahŕňajúce analgetická reakcia a angopend, ktoré sa môžu vyskytnúť zriedkavo (1/10 000 až <1/1000), a akútne zlyhanie obličiek. **Reakcie:** Najčastejšie: bolesť hlavy, závraty, tŕnenie hlavy, palpitácie, závraty, horúčka, bolesť brucha, nauzea, ospalosť, horúčka, opuch a iné. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjevska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko. **Dátum revízie textu:** marec 2019. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpisovaním si prečítajte úplnú informáciu o produkte (SPC). Učtené pre odbornú verejnosť.

Úplnú informáciu o lieku získate na adrese: KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava, www.krka.sk. **Dátum prijatý materiál:** jún 2020. **Valtricom 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety, Valtricom 5 mg/160 mg/25 mg filmom obalené tablety, Valtricom 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety, Valtricom 10 mg/160 mg/25 mg filmom obalené tablety.** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Terapeutické indikácie:** Lieka esenciálnej hypertenzie. Súbežne s indikovaný došejky. Ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. **Bákovanie:** Odporúča sa dávkovanie 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu. **Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:** Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilat) a 160 mg valsartanu.



PIATOK 16. 10. 2020

Sála	Bellevue I	Bellevue II	Bellevue III
8:00 – 9:00	ODVRÁŤME 11 TISÍC ZBYTOČNÝCH ÚMRTÍ	DIABETICKÁ NEUROPATIA V AMBULANCI PRAKTICKÉHO LEKÁRA <i>Blok podporený spoločnosťou WÖRWAG Pharma</i>	
9:10 – 10:10	ZMENIŤ ČI NEZMENIŤ PRAX NAŠU KAŽDODENNÚ? TO JE OTÁZKA! <i>Blok podporený spoločnosťou KRKA</i>	TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA, WELL-BEING (Ako žiť svoj život aby sme boli zdraví)	VARIA
10:20 – 11:20	DÔLEŽITÉ EKG OBRAZY – ako ich správne rýchlo efektívne čítať a interpretovať v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých?	DIABETOLOGICKÝ BLOK	TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS PODPORIŤ IMUNITNÝ SYSTÉM
11:30 – 12:30	ZAÚJÍMAVOSTI Z AMBULANCIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA <i>Blok podporený spoločnosťami ZENTIVA a.s. a MERCK</i>	„SRDCE SRDCU“ <i>Blok Slovenskej ligy za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení</i>	STOMATOLÓGIA
12:30 – 13:15	OBED		
13:15 – 14:15	SKÚSENOSTI VŠEOBECNÉHO LEKÁRA VO VEĽKEJ BRITÁNII	SKÚSENOSTI VŠEOBECNÉHO LEKÁRA VO VEĽKEJ BRITÁNII	ÚLOHA SESTRY V MANAŽMENTE PACIENTA S HYPERTENZIOU <i>Blok podporený spoločnosťou SERVIER Slovensko</i>
14:25 – 15:40	ŠDTP V LIEČBE AH NA SLOVENSKU AKO IMPLEMENTÁCIA ESC/ESH 2018 ODPORÚČANÍ PRE MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE		VOJTOVA METODIKA - JIŽ 55 LET
15:50 – 16:50	OVPLYVNIL COVID-19 NAŠE ZDRAVIE? <i>Blok podporený spoločnosťou MYLAN</i>	BLOK ROZUMNEJ FARMAKOTERAPIE	PSYCHIATRICKÝ BLOK
17:00 – 18:00	ANGIOLOGICKÝ BLOK	VARIA	AKO MÔŽE VÝŽIVA ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

100 tabletové balenia pre vašich pacientov



CONCOR 5mg
100 tbl.



CONCOR 10mg
100 tbl.



CONCOR COR 5mg
100 tbl.

Pred použitím sa oboznámte s kompletnou informáciou o lieku v SPC dostupnom na www.sukl.sk na adrese spoločnosti Merck. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

*Kategorizácia liekov <http://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov>
MERCK spol. s r. o., Dvořákovo nábřeží 4, Bratislava, Slovensko
SK/CONCO/0320/0005



MERCK

SOBOTA 17. 10. 2020

Sála	Bellevue I	Bellevue II	Bellevue III
8:00 – 9:20	POPULAČNÉ ONKOLOGICKÉ SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY	CORONA U NAS a VO SVETE – teleprenos	
9:30 – 10:30	PANDÉMIA COVID-19 A OČKOVANIE <i>Blok Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej a spoločnosti (SEVS)</i>	SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE VÝŽIVU A PREVENCIU	“NA SLOVÍČKO S ORTOPÉDMI” - moderovaná diskusia <i>Interaktívny diskusný blok</i>
13:00	UKONČENIE KONFERENCIE		

SESTERSKÁ SEKCIA

Sekcia sestier bude vysielaná on-line v náhradnom termíne o termíne vás budeme včas informovať

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
I. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
OTVORENIE KONFERENCIE KRST KNIHY ODVRÁTITELNÉ RIZIKÁ CHORÔB OBEHOVEJ SÚSTAVY, EDUKÁCIA SESTROU
II. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
III. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
OBED
IV. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

BRONCHO-VAXOM®

ZVYŠUJE PRIPRAVENOSŤ IMUNITNÉHO SYSTÉMU VAŠICH PACIENTOV
NA OCHRANU PRED OPAKUJÚCIMI SA INFEKCIAMI DÝCHACÍCH CIEST¹⁻⁶

**TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS PRIPRAVIŤ
ICH IMUNITNÝ SYSTÉM!**



OBRÁZOK JE ILUSTRACNÝ, A NEPREDSTAVUJE REÁLNYCH PACIENTOV.

- 1 BRONCHO-VAXOM® Swiss Summary of Product Characteristics.
- 2 Rossi GA, et al. European Respiratory J. 2019;5(1):17–23.
- 3 Kearney SC, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015;114(5):364–369.
- 4 Parola C, et al. PLoS One. 2013;8(12):e82867 [pre-clinical data].
- 5 Pasquali C, et al. Front Med (Lausanne). 2014;1:41 [pre-clinical data].
- 6 Dang AT, et al. Sci Rep. 2017;7:43844 [pre-clinical data].

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU. NÁZOV: BRONCHO-VAXOM pre dospelých, BRONCHO-VAXOM pre deti.
Liečivo: Zmes bakteriálneho lyzátu (*Haemophilus influenzae*, *Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae*, *Klebsiella pneumoniae* ssp. *pneumoniae* a ssp. *ozaena*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes* a *sanguinis (viridans)*, *Moraxella catarrhalis*): 7 mg (dospelí) a 3,5 mg (deti).
Indikácie: Profylaxia rekurentných infekcií dýchacích ciest u dospelých a detí starších ako 6 mesiacov. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Preventívna liečba: 1 tvrdá kapsula (vrecko) denne nalačno po dobu 10 po sebe nasledujúcich dní v troch po sebe idúcich mesiacoch. Profylaktická liečba sa môže začať počas akútnej fázy infekcie dýchacích ciest, v kombinácii s inými liečbami. Perorálne podanie. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Deti mladšie ako 6 mesiacov. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Používanie BRONCHO-VAXOM na prevenciu vzniku pneumónie sa neodporúča, pretože nie sú k dispozícii žiadne údaje z klinických štúdií, ktoré takýto účinok preukazujú. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Ako preventívne opatrenie je vhodné vyhnúť sa používaniu lieku počas gravidity. Počas dojčenia sa má liek podávať obozretne. Neboľ preukázaný účinok lieku na fertilitu. **Nežiaduce účinky:** Liek je obvykle dobre znášaný. Ako časté nežiaduce účinky sa môžu objaviť bolesti hlavy, kašeľ, diarea, abdominálna bolesť, vyrážka. Pri výskyte nežiaducich účinkov je potrebné sa poradiť s lekárom. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii - OM PHARMA S.A., Amadora - Lisabon, Portugalsko.**
Registračné čísla: Broncho-Vaxom pre dospelých, 7 mg, cps dur: 59/0053/845; Broncho-Vaxom pre deti, 3,5 mg, cps dur: 59/0052/845; BRONCHO-VAXOM pre deti, 3,5 mg pvl por: 59/0507/065. **Dátum revízie textu:** Január 2020. Úplné znenie Súhrnu charakteristických vlastností lieku je dostupné na: www.sukl.sk. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis a je hrađený zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Blížšie informácie získate na adrese: OM Pharma SA/Vifor Pharma, Rue du Bois-du-Lan 22, P.O.Box 88, 1217 Meyrin 2/Genève/SWITZERLAND, www.viforpharma.com



Benela
staráme sa o vašu imunitu
Súbežná 7, 811 04 Bratislava

ŠTVRTOK – 15. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE I.

8:00 – 9:00

ČO JE NOVÉ VO VYKAZOVANÍ VÝKONOV (WS)

Predsedníctvo: L. Resutíková, E. Hudobová

- **Prehľad aktuálnych výkonov v správnych kombináciách**
E. Hudobová (Banská Bystrica), L. Resutíková (Želovce)

9:10 – 10:10

HĽADÁM AMBULANCIU, HĽADÁM NÁSLEDOVNÍKA, AKO NA TO

Predsedníctvo: P. Lipovský, M. Matusová

- **Ako som to spravil ja ...**
P. Lipovský (Alžbetin Dvor)
- **Ako som to spravila ja ...**
M. Matusová (Dunajská Streda)
- **Ekonom – ako na to, ako získať prostriedky**

10:20 – 11:20

**ROZDIEL MEDZI TÝM ČO „MUSÍM“ A ČO „MÔŽEM“
(zmeny v legislatíve a ohrozenia v praxi VLD)**

Predsedníctvo: P. Makara, I. Humeník

- **Aké najvýznamnejšie zmeny sa udiali v právnej úprave** • Abstrakt č. 1
I. Humeník (Košice)
- **Niekoľko kazuistik z prípadov všeobecných lekárov**
I. Humeník (Košice)

11:30 – 11:50

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE**KRST KNIHY ODVRÁTITELNÉ RIZIKÁ
CHORÔB OBEHOVEJ SÚSTAVY, EDUKÁCIA SESTROU**

11:50 – 12:30

TÉMA REZERVOVANÁ PRE MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

12:30 – 13:30

OBED

13:30 – 14:30

**AKO SPRÁVNE PRISTUPOVAŤ K LIEČBE VERTEBROGÉNNYCH
OCHORENÍ?****Blok podporený spoločnosťou KRKA**

Predsedníctvo: A. Šimková, M. Grofík, E. Veselíny, M. Dvorák

- **Problematika vertebrogénnych ochorení**
M. Dvorák (Spišská Nová Ves)
- **Aktualizované odporúčania pre liečbu vertebrogénnych bolestí** • Abstrakt č. 2
M. Grofík (Martin)

ŠTVRTOK – 15. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE I.

- **Najvhodnejšie NSA do praxe všeobecného lekárstva. Čo rozhoduje?**

- Abstrakt č. 3
A. Šimková (Pezinok)

- **Gastroprotektia u rizikových pacientov - možnosti dlhodobej liečby IPP**
E. Veselíny (Košice)

14:40 – 15:40

**VENÓZNE OCHORENIA – KAŽDODENNÁ PRAX VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
Blok podporený spoločnosťou SERVIER Slovensko**

Predsedníctvo: V. Štvrtinová, J. Bendová, J. Mikloš

- **Farmakologická liečba v jednotlivých klinických štádiách CHVO vo svetle nových medzinárodných odporúčaní**
V. Štvrtinová (Bratislava)
- **CHVO – postup liečby z pohľadu všeobecného lekára**
J. Bendová (Veľký Biel)
- **Hemoroidálne ochorenie – algoritmus liečby**
J. Mikloš (Poprad)

15:50 – 16:50

VIEME AKO ZABEZPEČIŤ SPRÁVNE FUNGOVANIE KVS SYSTÉMU?**Blok podporený spoločnosťou MYLAN**

Predsedníctvo: R. Zanovít, I. Šoošová, B. Vohnout, I. Majerčák

- **Fixné kombinácie a hypertenzia. Prečo, ako a kedy?**
I. Šoošová (Bratislava)
- **Čo potrebujeme vedieť o dyslipidémii pre každodennú prax**
B. Vohnout (Bratislava)
- **Koľko rokov majú Vaše artérie?** • Abstrakt č. 4
I. Majerčák (Košice)

17:00 – 18:00

CHOROBY PEČENE A PRAKTIK**Blok Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS**

Predsedníctvo: J. Kaňuch, P. Jarčuška, S. Dražilová, M. Janičko

- **Vírusové hepatitídy - čo je nové v roku 2020?**
P. Jarčuška (Košice)
- **Intrahepatálna cholestáza- princípy diagnostiky a liečby**
S. Dražilová (Košice)
- **Čo by mal vedieť praktický lekár o diagnostike a manažmente cirkózy pečene**
M. Janičko (Košice)

ŠTVRTOK – 15. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE II.

9:10 – 10:10

PREVENIA A LIEČBA VYBRANÝCH PLŮCNYCH OCHORENÍ UP TO DATE**Blok podporený spoločnosťou MSD**

Predsedníctvo: S. Ostrovská, I. Solovič, M. Luknár

- **Primárna prevencia pneumokokových pneumónií – up to date**
I. Solovič (Vyšné Hágy)
- **Plúcna hypertenzia pre lekárov prvého kontaktu**
M. Luknár (Bratislava)

10:20 – 11:20

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K TERAPII OBEZITY V ČESKÉ REPUBLICCE

Predsedníctvo: B. Blahová, I. Málková, P. Šrámková

- **Nová farmakoterapie obezity v ordinaci lékaře** • Abstrakt č. 5
P. Šrámková (Praha)
- **Důležitost psychologického přístupu k úspěšné terapii obezity**
• Abstrakt č. 6
I. Málková (Praha)
- **Praktická aplikace kognitivně behaviorálního přístupu v kurzech a on-line aktivitách STOBu** • Abstrakt č. 7
M. Pávek, H. Pávková-Málková (Praha)

12:30 – 13:30

OBED

13:30 – 14:30

DERMATOLOGICKÝ BLOK

Predsedníctvo: P. Pekarovič, H. Zelenková

- **Ulcere cruris u obézných pacientov** • Abstrakt č. 8
H. Zelenková (Svidník)
- **Erysipelas cruris a obezita** • Abstrakt č. 9
M. Sakalíková (Svidník)
- **Lymfedém alebo obezita?** • Abstrakt č. 10
L. Zeherová (Svidník)
- **Technické problémy kompresie u obézných pacientov** • Abstrakt č. 11
L. Zeherová (Svidník)
- **...to ste ešte asi nevideli** • Abstrakt č. 12
H. Zelenková (Svidník)

ŠTVRTOK – 15. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE II.

14:40 – 15:40

ZDRAVOTNÍCKE IT V TREŤOM TISÍCROČÍ. ČO NÁM UKÁZAL KORONAVÍRUS A ČO MUSÍME RIEŠIŤ

Predsedníctvo: A. Šimková, M. Adam

- **Prínos online medicíny v ambulancii VLD**
A. Šimková (Pezinok)
- **Zdravotnícke IT v treťom tisícročí: Čo nám ukázal koronavírus a čo musíme spoločne riešiť**
M. Adam (Bratislava)
- **Virtuálna ambulancia – realita alebo utópia**
M. Skulinková (Bratislava)

15:50 – 16:50

VPLYV SPRÁVANIA NA ŽIVOTNÝ ŠTÝL A RIZIKÁ NÁDOROVÝCH CHORÔB

Predsedníctvo: R. Antoš, P. Minárik, D. Mináriková, Z. Katreniaková

- **Motivačno-sankčné mechanizmy v primárnej prevencii nádorových ochorení** • Abstrakt č. 13
Z. Katreniaková, I. Rajničová Nagyová (Košice)
- **Pripravenosť na zmenu v manažment telesnej hmotnosti** • Abstrakt č. 14
D. Mináriková, P. Minárik (Bratislava)
- **Postavenie telemedicíny a distančného poradenstva v procese komplexného manažmentu obezity. Reálne možnosti pre lekárov primárneho kontaktu** • Abstrakt č. 15
P. Minárik, D. Mináriková (Bratislava)
- **Ako komunikovať s pacientom? Praktické možnosti v ambulancii lekára**
R. Herda (Bratislava)

17:00 – 18:00

HIV AWARENESS**Blok podporený spoločnosťou GSK**

Predsedníctvo: M. Matusová, K. Šimková

- **HIV infekcia v ambulancii všeobecného lekára**
Interaktívna prednáška – hlasovanie – mini-kvíz
K. Šimeková (Martin)
- **Porovnanie topických foriem lokálnych analgetík**
R. Stančík (Piešťany)

ŠTVRTOK – 15. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE III.

9:10 – 10:10

CHRÁNITE SVOJICH PACIENTOV, CHRÁŇTE AJ SEBA**Blok podporený spoločnosťou RENOMIA**

Predsedníctvo: H. Ihnát, D. Kobanová

- **Exkluzívny produkt komplexného poistenia ambulancie pre členov SSVPL**
D. Kobanová (Košice)
- **Čo sa mi môže stať – konkrétne príklady z praxe**
H. Ihnát (Košice)

10:20 – 11:20

MODERNÁ MEDICÍNA - MANAŽMENT PACIENTA NA DIALKU S NOVÝMI TECHNOLOGIAMI**Interaktívny diskusný blok**

Predsedníctvo: P. Kmeč, A. Švrčková

- **Nové online technológie pre všeobecných lekárov. Efektívne sledovanie objektívnych parametrov**
A. Švrčková (Skalica), P. Kmeč (Bratislava)
- **Bezpečnosť prenosu zdravotných dát. Interdisciplinárna online komunikácia so ŠAS**
- **VLD Team online. Odmeňovanie lekárov v online priestore**

12:30 – 13:30

OBED

13:30 – 14:30

DARCOVSKÝ A TRANSPLANTAČNÝ PROGRAM**Blok Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS**

Predsedníctvo: P. Makara, L. Beňa, Z. Žilinská, I. Dedinská, M. Chrastina

- **Transplantácia obličky – základné princípy a súvislosti** • Abstrakt č. 16
Z. Žilinská (Bratislava)
- **Darcovstvo orgánov – medicínske, legislatívne a etické aspekty**
• Abstrakt č. 17
M. Chrastina (Bratislava)
- **Transplantácia obličky od živého darcu** • Abstrakt č. 18
I. Dedinská (Martin), T. Baltsová (Košice), L. Beňa (Košice), E. Lacková (Banská Bystrica), Z. Žilinská (Bratislava)
- **Transplantácia obličky a všeobecný lekár – pohľad z oboch strán**
• Abstrakt č. 19
L. Beňa (Košice), T. Baltsová (Košice), I. Gaľa (Košice), P. Makara (Snina)

ŠTVRTOK – 15. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE III.

14:40 – 15:40

VARIA

Predsedníctvo: S. Ostrovská, P. Lipovský, Š. Soták

- **Nebojte sa riešiť problém hemoroidov včas s unikátnym produktom od slovenského výrobcu – RECTOVENAL ACUTE** • Abstrakt č. 20
Prednáška podporená spoločnosťou STADA
S. Ostrovská (Bratislava)
- **Recidivujúce infekcie močových ciest – nové poznatky**
Prednáška podporená spoločnosťou Aloris Vital
P. Lipovský (Alžbetin dvor)
- **Nežiaduce účinky psychiatrických liečiv** • Abstrakt č. 21
Š. Soták (Humenné)

15:50 – 16:50

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Predsedníctvo: J. Bendová, P. Makara

- **Diskusia so zástupcami všetkých 3 zdravotných poisťovní o tom, aká bola zdravotná starostlivosť počas 1. vlny pandémie v primárnej a v špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ako sa ujali výkony telemedicíny v praxi a aká je budúcnosť financovania VLD v podmienkach očakávanej ekonomickej krízy**
UNION ZP E. Májeková, P. Sloboda
DÔVERA ZP M. Faktor
VŠZP B. Havelková

17:00 – 18:00

SPOLUPRÁCA ODBOROV ZDRAVOTNÍCTVA SAMOSPRÁVNÝCH KRAJOV SK 8 SO VŠEOBECNÝMI LEKÁRMÍ**Blok VÚC**

Predsedníctvo: P. Lipovský, J. Bendová

- **Interaktívne stretnutie zástupcov samosprávnych krajov s VLD**
- **Ako vnímajú VÚC situáciu vo všeobecnom lekárstve, aké projekty na podporu a obnovu všeobecného lekárstva VÚC v súčasnosti ponúkajú a aké pripravujú**
S. Pekarčíková (Žilina)
- **Najčastejšie podnety na VLD, ktoré VÚC dostávajú a ako ich riešia a návrh projektu na zmenu prístupu k ordinačným hodinám VLD**
T. Szalay (Bratislava)

PIATOK – 16. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE I.

8:00 – 9:00

ODVRÁŤME 11 TISÍC ZBYTOČNÝCH ÚMRTÍ

Predsedníctvo: M. Macháčová, R. Fides, R. Herda

- **Predstavenie projektu „Sekunda pre život“, ktorý bude realizovaný pod záštitou SSVPL**

9:10 – 10:10

ZMENIŤ ČI NEZMENIŤ PRAX NAŠU KAŽDODENNÚ? TO JE OTÁZKA!**Blok podporený spoločnosťou KRKA**

Predsedníctvo: J. Števlík, M. Mora, P. Lipovský

- **„Od zlovykov k dobrým zvykom“ nová fixná trojkombinácia antihypertenzív** • Abstrakt č. 22
J. Števlík (Bratislava)
- **Telmisartan – ako si „hladko“ poradiť s variabilitou krvného tlaku?**
M. Mora (Nové Mesto nad Váhom)
- **Telemedicina – nový prístup k liečbe hypertónie, nie len počas mimoriadnej situácie**
P. Lipovský (Alžbetin Dvor)

10:20 – 11:20

DÔLEŽITÉ EKG OBRAZY - ako ich správne rýchlo efektívne čítať a interpretovať v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých?**Interaktívna prednáška - hlasovanie**

Predsedníctvo: S. Filipová, L. Resutíková

- **Ischémia myokardu na EKG, EKG pri hypertrofii / dilatácii komôr a predsieni**
S. Filipová (Bratislava)
- **Kazuistika: EKG ako kľúč k rozšírenej diagnostike hypertónie**
L. Resutíková (Želovce)
- **Zriedkavejšie sa vyskytujúce EKG obrazy – ktoré by sme mali určite poznať už v ambulancii?**
S. Filipová (Bratislava)

11:30 – 12:30

ZAUJÍMAVOSTI Z AMBULANCIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA**Blok podporený spoločnosťami ZENTIVA a. s. a MERCK**

Predsedníctvo: I. Martuliak, S. Dražilová, A. Vachulová, L. Ondrůšek

- **Guajfenesin v ambulancii všeobecného lekára** • Abstrakt č. 23
I. Martuliak (Banská Bystrica)
Prednáška podporená spoločnosťou ZENTIVA
- **PPI v rukách praktického lekára alebo 3xK (ktorý, kedy, koľko)** • Abstrakt č. 24
S. Dražilová (Košice)
Prednáška podporená spoločnosťou ZENTIVA
- **Prečo je dôležité merať srdcovú frekvenciu súčasne s meraním tlaku krvi** • Abstrakt č. 25
A. Vachulová (Bratislava)
Prednáška podporená spoločnosťou MERCK
- **Sú všetky betablokátory rovnaké?** • Abstrakt č. 26
L. Ondrůšek (Prešov)
Prednáška podporená spoločnosťou MERCK

PIATOK – 16. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE I.

12:30 – 13:15

OBED

13:15 – 14:15

SKÚSENOSTI VŠEOBECNÉHO LEKÁRA VO VEĽKEJ BRITÁNII

Predsedníctvo: J. Bendová

- **Kľúčové posolstvo**
L. Revická (Glasgow, UK) Slovenka pracujúca ako GP vo Veľkej Británii

14:25 – 15:40

ŠDTP V LIEČBE AH NA SLOVENSKU AKO IMPLEMENTÁCIA ESC/ESH 2018 ODPORÚČANÍ PRE MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE

Predsedníctvo: S. Filipová, A. Vachulová, A. Šimková

- **Ako včas a správne urobiť primodiagnostiku artériovej hypertenzie v ambulantných podmienkach?** • Abstrakt č. 27
S. Filipová (Bratislava)
- **Základy liečebných algoritmov artériovej hypertenzie**
A. Vachulová (Bratislava)
- **Komplexný manažment hypertónie v ambulancii všeobecného lekára a spolupráca so špecialistami**
A. Šimková (Pezinok)
Panelová interaktívna diskusia (otázky a odpovede)

15:50 – 16:50

OVPLYVNIL COVID-19 NAŠE ZDRAVIE?**Blok podporený spoločnosťou MYLAN**

Predsedníctvo: S. Ostrovská, Z. Krištúfková, B. Pekárková, A. Vachulová

- **Očkovanie proti chripke v období pandémie Covid-19**
Z. Krištúfková (Bratislava)
- **Ako ovplyvnil Covid-19 pacientov s gastroenterologickými problémami** • Abstrakt č. 28
B. Pekárková (Trnava)
- **Život pacienta v správnom rytme, aj po pandémii Covid-19** • Abstrakt č. 29
A. Vachulová (Bratislava)

17:00 – 18:00

ANGIOLOGICKÝ BLOK

Predsedníctvo: J. Kaňuch, K. Dostálová, D. Kmecová, Š. Pataky

- **Heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou v prevencii a liečbe venózneho tromboembolizmu – kedy? komu? ako dlho?** • Abstrakt č. 30
K. Dostálová, L. Kukučková, K. Gazdíkova, Š. Moricová (Bratislava)
- **Rozhodovanie o forme invazívnej liečby u pacientov s chronickým venóznym ochorením** • Abstrakt č. 31
Š. Pataky, P. Pedowski (Košice)
- **Kompresívna terapia v liečbe chronickej venózneho a lymfatickej insuficiencie** • Abstrakt č. 32
D. Kmecová, J. Kmec, M. Rašiová (Košice)

PIATOK – 16. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE II.

8:00 – 9:00

DIABETICKÁ NEUROPATIA V AMBULANCIÍ PRAKTICKÉHO LEKÁRA**Blok podporený spoločnosťou WÖRWAG Pharma**

Predsedníctvo: J. Kaňuch, M. Kolísek, M. Grofik, M. Turčanová-Koprušáková

Diabetes mellitus typ 3, Nutraceutické prístupy v liečbe inzulínovej rezistencie mozgu • Abstrakt č. 33

M. Kolísek (Martin)

Diabetická polyneuropatia – diagnostika a liečba • Abstrakt č. 34

M. Grofik (Martin)

Diferenciálna diagnostika polyneuropatií • Abstrakt č. 35

M. Turčanová – Koprušáková (Martin)

9:10 – 10:10

**TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA, WELL-BEING
(Ako žiť svoj život aby sme boli zdraví)**

Predsedníctvo: S. Bachledová, J. Jaseň, J. Lucký, D. Balková

- **Zdravý človek z hľadiska taoizmu, Prednáška je zaměřená na seznámení s taoistickým konceptem pěti kořenů lidské bytosti**

J. Jaseň (Hriňová)

- **Prístup k liečbe epidemických onemocnení v tradiční čínské medicíně**

J. Lucký (Praha, CZ)

- **Bolesti v oblasti dolného žiariča, alebo v oblasti epigastria**

D. Balková (Lučenec)

10:20 – 11:20

DIABETOLOGICKÝ BLOK

Predsedníctvo: J. Fábry, A. Šimková

- **Spolupráca v manažmente starostlivosti o diabetika a prediabetika medzi ambulanciou všeobecného lekára a diabetológa**

M. Fábry (Bratislava)

- **Význam edukácie v starostlivosti o diabetika – diétny režim ako súčasť liečby diabetika**

M. Macko (Prešov)

11:30 – 12:30

„SRDCE SRDCU“**Blok Slovenskej ligy za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení**

Predsedníctvo: J. Lietava

- **Prevenia a liečba kardiometabolických ochorení u seniorov**

B. Vohnout (Bratislava)

- **Prevenia a liečba hypertenzie u seniorov** • Abstrakt č. 36

V. Kosmalová (Bratislava)

- **Prevenia a liečba dyslipidémie u seniorov** • Abstrakt č. 37

J. Lietava

PIATOK – 16. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE II.

12:30 – 13:15

OBED

13:15 – 14:15

SKÚSENOSTI VŠEOBECNÉHO LEKÁRA VO VEĽKEJ BRITÁNII

Predsedníctvo: J. Bendová

- **KLúčové posolstvo**

L. Revická (Glasgow, UK) Slovenka pracujúca ako GP vo Veľkej Británii

15:50 – 16:50

BLOK ROZUMNEJ FARMAKOTERAPIE

Predsedníctvo: J. Bendová, J. Gajdošík, O. Sukeľ

- **Je polyfarmácia, polypragmázia a hyperpreskripcia problémom VLD v podmienkach SR?**

Gajdošík (Nové Zámky)

- **Vek nie je len číslo** • Abstrakt č. 38

O. Sukeľ (Humenne)

- **Projekt Vyberaj rozumne (Choosing wisely) vo svete i na Slovensku**

J. Bendová (Veľký Biel)

17:00 – 18:00

VARIA

Predsedníctvo: R. Antoš, D. Mináriková, P. Minárik

- **Klinický prínos esenciálnych fosfolipidov pri liečbe nealkoholovej tukovej choroby pečene a imunokompetentné vlastnosti pečene** • Abstrakt č. 39

P. Minárik, D. Mináriková (Bratislava)

Prednáška podporená spoločnosťou SANOFI

- **Histaminová intolerancia, mýty a fakty** • Abstrakt č. 40

J. Orosová (Bratislava)

Prednášku podporila spoločnosť STADA

- **Potreba a možnosti terapie nedostatku vitamínu D** • Abstrakt č. 41

E. Janeková (Bratislava)

Prednášku podporila spoločnosť STADA

PIATOK – 16. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE III.

9:10 – 10:10

VARIA

Predsedníctvo: P. Makara, I. Martuliak, R. Mužík, E. Kováčová

- **Fixná kombinácia paracetamol – ibuprofén v liečbe bolesti** • Abstrakt č. 42
I. Martuliak (Banská Bystrica)
Prednáška podporená spoločnosťou GLENMARK
- **Môžu dáta zdravotnej poisťovne pomôcť pri rozhodovaní v liečbe artériovej hypertenzie?** • Abstrakt č. 43
R. Mužík, T. Szalay (Bratislava)
Prednáška podporená Zdravotnou poisťovňou Dôvera
- **Zlyhanie obličiek? Máte na výber!** • Abstrakt č. 44
E. Kováčová (Trenčín)

10:20 – 11:20

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS PODPORIŤ IMUNITNÝ SYSTÉM*Blok podporený spoločnosťou Benela*

Predsedníctvo: B. Blahová, R. Košturiak

- **Imunomodulačná liečba bakteriálnymi lyzátmi**
R. Košturiak (Nitra)
- **Prevenia infekcií močových a dýchacích ciest**
B. Blahová (Krompachy)

11:30 – 12:30

STOMATOLÓGIA

Predsedníctvo: P. Pekarovič, P. Anđel

- **Zuby ako spoločník, alebo celoživotné trápenie?**

P. Anđel (Hlohovec)

Rodíme sa bez zubov. Krátko nato sa objavia v ústach aby sme mohli spracovávať potravu. U niekoho skoro, u niekoho neskôr prídu problémy a u niekoho vôbec sa kazy neobjavia. Môžeme si za najčastejšie ochorenia v ústach sami? Može za ne náš zubár? Kde sú príčiny a čo môžeme už dnes urobiť, aby som opravy zubov viac nepotreboval? Čo nám zubný lekár nepovie? Ide len o biznis so zdravím? Odpovede a oveľa viac sa dozvieme z prednášky.

12:30 – 13:15

OBED

13:15 – 14:15

ÚLOHA SESTRY V MANAŽMENTE PACIENTA S HYPERTENZIOU*Blok podporený spoločnosťou SERVIER Slovensko*

Predsedníctvo: A. Šimková, V. Hlavatá

- **Manažment pacienta s hypertenziou podľa platných odporúčaní**
A. Šimková (Pezinok)
- **Ako to robím ja**
V. Hlavatá (Trnava), J. Adamčíková (Trnava), L. Vašková (Trnava)
- **Diskusia**

PIATOK – 16. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE III.

14:25 – 15:40

VOJTOVA METODIKA – JIŽ 55 LET

Predsedníctvo: V. Krucký, P. Pekarovič

- **Od objvu prvé reflexní zóny v roce 1965 k současné Vojtově metodice 2. generace využívající pokročilé technologie a robotická lůžka**
V. Krucký (Praha, ČR)
- **Výsledky kazuistiky pacientky po traumatické míšní lézi**
V. Krucký (Praha, ČR)

15:50 – 16:50

PSYCHIATRICKÝ BLOK

Predsedníctvo: N. Makarová, J. Dragašek, M. Virčík

- **Ako správne farmakologicky ovplyvňovať poruchy z úzkostného spektra?**
J. Dragašek (Košice)
- **Depresívna porucha: Ako von z bludného kruhu?** • Abstrakt č. 45
M. Virčík (Michalovce)
- **Nespavosť – častý príznak, nielen psychických porúch**
N. Makarová (Snina)

17:00 – 18:00

AKO MÔŽE VÝŽIVA ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Predsedníctvo: S. Bachledová, P. Olexa

- **Sarkopenická obezita je najčastejšiou formou malnutricie našich seniorov**
P. Olexa (Košice)
- **Posudzovanie nutričného stavu a nutričná intervenencia ako súčasť komplexnej starostlivosti o pacienta v ambulancii VPL** • Abstrakt č. 46
S. Bachledová (Košice)
- **Integrovaný prístup k udržiavaniu svalovej hmoty s cieľom zvýšenia QoL pacienta**
P. Lipták (Bratislava)

SOBOTA – 17. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE I.

8:00 – 9:20

POPULAČNÉ ONKOLOGICKÉ SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY

Predsedníctvo: M. Matusová, A. Országh, M. Rečková, J. Trautenberger Ricová

- **Populačné onkologické skriningové programy** • Abstrakt č. 47
M. Rečková (Bratislava)
- **Skríning kolorektálneho karcinómu – aké máme v súčasnosti možnosti?**
• Abstrakt č. 48
A. Országh (Bratislava)
- **Prvá fáza skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku**
• Abstrakt č. 49
L. Kuťáková (Bratislava)
- **Súčasný skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku a úloha VLD**
• Abstrakt č. 50
J. Trautenberger Ricová (Bratislava)

9:30 – 10:30

PANDÉMIA COVID-19 A OČKOVANIE**Blok Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej a spoločnosti (SEVS)**

Predsedníctvo: S. Ostrovská, Z. Krištúfková

- **Pandémia COVID-19 v Slovenskej republike pohľadom epidemiológa**
M. Avdičová, M. Štefkovičová, J. Námešná (Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava)
- **Vakcíny proti COVID-19 – máme sa ich obávať?**
H. Hudečková (Martin)
- **Chrípka a jej vplyv na kardiovaskulárny systém**
Z. Krištúfková (Bratislava)
Prenáška podporená spoločnosťou SANOFI
- **Pneumokokové zápaly pľúc – stála hrozba a možnosti ich prevencie**
• Abstrakt č. 51
I. Solovič (Vyšné Hágy)
Prenáška podporená spoločnosťou PFIZER

SOBOTA – 17. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE II.

8:00 – 9:20

CORONA U NÁS A VO SVETE – TELEPRENOS

Predsedníctvo: J. Bendová

- **Video rozhovory so všeobecnými lekármi z celej Európy**
M. Holmes (GB), T. Pekez Pavliško (HR), E. Klusová (CZ), F. Privati (IT), P. Kolesnyik (UA), R. Dijkstra (NL), O. Kravtchenko (NO), L. Bezdičková (CZ)

9:30 – 10:30

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE VÝŽIVU A PREVENCIU

Predsedníctvo: T. Kolonyi, P. Minárik, J. Babjaková, A. Penesová

- **Projekt Potravinárskej komory Slovenska: „Zdravý tanier – vyznajte sa v potravinách a žite zdravšie“** • Abstrakt č. 52
P. Minárik, D. Mináriková (Bratislava)
Prenáška podporená spoločnosťou DANONE
- **Ktoré rizikové faktory sú spoločné pre kardiovaskulárne a onkologické choroby?** • Abstrakt č. 53
A. Penesová, J. Babjaková (Bratislava)
- **Vplyvy cirkadiánnych rytmov na zdravie** • Abstrakt č. 54
J. Babjaková, A. Penesová (Bratislava)

SOBOTA – 17. 10. 2020

SÁLA BELLEVUE III.

9:30 DO 10:30

„NA SLOVÍČKO S ORTOPÉDMI“ – MODEROVANÁ DISKUSIA**Interaktívny diskusný blok**

Predsedníctvo: A. Švrčková, P. Klein, M. Handžák

- **Sekcia ambulatných ortopédov SOTS (SAO) – partner pre všeobecných lekárov**
A. Švrčková (Skalica), P. Klein (Prešov), Handžák (Poprad)
- **Manažment pacientov s bolestivým ramenom: ochorenia a úrazy ramena**
• Abstrakt č. 55
P. Klein (Prešov), M. Handžák (Poprad), A. Švrčková (Skalica)
- **Proces vyšetrenia, sledovania, logistiky a liečby pacienta s bolestivým ramenom – kedy poslať pacienta k ortopédovi?**
M. Handžák (Poprad), P. Klein (Prešov), A. Švrčková (Skalica)

Sekcia sestier bude vysielaná on-line v náhradnom termíne
o termíne vás budeme včas informovať

I. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predseda: Renáta Suranovská, Antónia Mlynarčíková

- **Zdieľaná starostlivosť o pacienta s HIV/AIDS**
L. Balogová
Prednáška podporená spoločnosťou GSK
- **Sestra v 21. storočí** • Abstrakt č. 56
I. Drahoňová
- **„Zlyhanie obličiek? Máte na výber!“**
E. Kováčová, BIOHEM, spol. s r.o.


OTVORENIE KONFERENCIE A KRST KNIHY ODVRÁTITELNÉ RIZIKÁ CHORÔB OBEHOVEJ SÚSTAVY, EDUKÁCIA SESTROU

II. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predseda: Zuzana Gavalierová, Iveta Drahoňová

- **Vplyv obezity na vznik onkologických ochorení GITu** • Abstrakt č. 57
M. Belovičová, M. Popovičová, V. Ivanková.
- **Úloha sestry v manažmente pacienta s obezitou** • Abstrakt č. 58
V. Ivanková, M. Belovičová, T. Hudáková, J. Šulcová
- **Úskalía ošetrovateľského prístupu u extrémne obézneho pacienta**
• Abstrakt č. 59
T. Hudáková, M. Popovičová, V. Ivanková, J. Šulcová
- **Vzájomné vzťahy medzi diabetizou a chorobami pečene** • Abstrakt č. 60
M. Belovičová, J. Kaňuch, P. Matula
- **Vplyv životopravy na vznik recidívy akútneho koronárneho syndrómu**
• Abstrakt č. 61
J. Šulcová, A. Murgová, V. Ivanková, T. Hudáková
- **Sestry v pandémie COVID-19** • Abstrakt č. 62
V. Ivanková, M. Belovičová

Kyselina močová je klinickým markerom nielen pri všetkých kardiovaskulárnych, renálnych a metabolických ochoreniach, ale aj u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním^{1,2}



Skrátená informácia o lieku Aldepla 25 mg a 50 mg filmom obalené tablety.

Liečivo: Každá tableta obsahuje 25 alebo 50 mg eplerenónu. **Terapeutické indikácie:** Ako doplnok štandardnej liečby zahŕňajúcej betablokátory, na zníženie rizika kardiovaskulárnej mortality a morbidity u stabilizovaných pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejektčná frakcia ľavej komory LVEF ≤ 40 %) a klinickými znakmi srdcového zlyhávania po nedávno prekonanom infarkte myokardu. Ako doplnok štandardnej optimálnej liečby na zníženie rizika kardiovaskulárnej mortality a morbidity u dospelých pacientov so srdcovým zlyhávaním triedy NYHA II (chronickým) a systolickou dysfunkciou ľavej komory (LVEF ≤ 30 %). **Dávkovanie:** Pre pacientov so srdcovým zlyhávaním po infarkte myokardu: Odporúčaná udržiavacia dávka je 50 mg raz denne. Liečba má začať dávkou 25 mg raz denne a titrovať k cieľovej dávke 50 mg raz denne, najlepšie počas 4 týždňov, pričom je potrebné vziať do úvahy sérovú hladinu draslíka v sére. Liečba sa má začať do 3-14 dní po akútnom infarkte myokardu. Pre pacientov so srdcovým zlyhávaním triedy NYHA II (chronickým): Liečba má začať dávkou 25 mg jedenkrát denne a titrovať na cieľovú dávku 50 mg jedenkrát denne, najlepšie počas 4 týždňov, pričom je potrebné vziať do úvahy sérovú hladinu draslíka v sére. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť eplerenónu u detí a dospievajúcich neboli stanovené. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Počas liečby sa má starostlivo monitorovať hladina draslíka v sére. Tablety obsahujú laktózu. **Interakcie:** Súbežnému podávaniu s lítium, cyklosporínom alebo takrolimom sa treba vyhnúť. Pacientom, ktorí užívajú NSAID, sa musia pred začatím liečby vyšetriť obličkové funkcie a majú byť dostatočne hydratovaní. Súbežné podávanie s trimetoprimom zvyšuje riziko hyperkalémie. Kombinácia s alfa-1 blokátormi, tricyklickými antidepresívami, neuroleptikami, amifostinom a baklofénom môže viesť k posturálnej hypotenzii. Pri súbežnom podávaní so slabými až stredne silnými inhibítormi CYP3A4 nemá dávka eplerenónu prevýšiť 25 mg denne. Súbežné použitie so silnými indukčiami CYP3A4 sa neodporúča. **Nežiaduce účinky:** Časté: hyperkalémia, hypercholesterolemia, insomnie, závrat, synkopa, bolesť hlavy, zlyhanie ľavej komory, fibrilácia predsienej, hypotenzia, kašeľ, hnačka, nauzea, zápcha, vracanie, vyrážka, pruritus, svalové kŕče, bolesť chrbta, porucha funkcie obličiek, asténia, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi. Veľkosť balenia: 30x25 mg; 90x25 mg; 30x50 mg; 90x50 mg. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Egis Pharmaceuticals PLC, Maďarsko. **Dátum poslednej revízie textu:** November 2018. **Príloha k predpisovaniu lieku si pozorne prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekárske predpis. Úplná informácia o lieku na vyžiadanie.**

Skrátená informácia o lieku Milurit 100 mg, 200 mg a 300 mg tablety.

Liečivo: Každá tableta obsahuje 100 mg, 200 mg alebo 300 mg alopurinolu. **Terapeutické indikácie:** Dospelí: Všetky formy hyperurikémie, ktoré sa nedajú zvládnuť diétou, vrátane sekundárnej hyperurikémie rôzneho pôvodu a klinických komplikácií hyperurikemických stavov, najmä manifestnej dny, urátovnej nefropatie a na rozpúšťanie a prevenciu tvorby kryštálov kyseliny močovej (obličkových kameňov). Liečba rekurentných zmiešaných kalcium-oxalátových kryštálov pri súbežnej hyperurikémii, ak zlyhali pitný režim, diétna a podobné opatrenia. Deti a dospievajúci: Sekundárna hyperurikémia rôzneho pôvodu. Nefropatia spôsobená kyselinou močovou v priebehu liečby leukémií. Dedičné poruchy enzýmovej deficiencie, Leschov-Nyhanov syndróm (čiastočný alebo úplný deficit hypoxantinoguanilofosforibozyltransferázy) a deficit adenínfosforibozyltransferázy. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Dospelí: Alopurinol treba začať podávať v nízkych dávkach, napr. 100 mg denne, aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov. Odporúčane dávkovanie pre všetky indikácie: 100 až 200 mg denne pri miernych stavoch; 300 až 600 mg denne pri stredne ťažkých stavoch; 700 až 900 mg denne pri ťažkých stavoch. Ak sa vyžaduje dávkovanie na základe mg/kg telesnej hmotnosti, má sa použiť 2 až 10 mg alopurinolu na 1 kg telesnej hmotnosti za deň. Pediatrická populácia: Odporúčaná dávka je 10 až 20 mg/kg telesnej hmotnosti za deň až do maximálnej dávky 400 mg denne v 3 rozdelených dávkach. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. **Osobitné upozornenia:** Hypersenzitívne reakcie na alopurinol sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi, vrátane makulopapulárneho exantému, syndrómu precitlivenosti (známy tiež ako DRESS) a SJS/TEN. Ak sa takéto reakcie objavia kedykoľvek v priebehu liečby, alopurinol sa musí okamžite vysadiť. U pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek a súbežným užívaním diuretik, najmä tiazidov, môže byť zvýšené riziko vzniku hypersenzitívnych reakcií. U pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek treba použiť zníženú dávku. Liečba sa nesmie začať, pokiaľ akútny záchvat dny úplne neustúpi, keďže alopurinol môže vyvolať ďalšie záchvaty. Milurit 100 mg obsahuje laktózu. **Liečivé a iné interakcie:** so salicylátmi a urikozurikami, kumarínovými antikoagulantmi, teofylínom, ampicilínom/amoxicilínom, hydroxidom hlinitým, ACE inhibítormi, diuretikami, cyklosporínom, cytotatikami. **Nežiaduce účinky:** Časté: vyrážka, zvýšenie hladiny hormónu stimulujúceho štítnu žľazu v krvi. Menej časté: reakcie z precitlivenosti, vracanie, nauzea, hnačka, abnormálne výsledky testov funkcie pečene. **Veľkosť balenia:** 50 x 100 mg; 30 x 200 mg; 30 x 300 mg; 100 x 300 mg. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Egis Pharmaceuticals PLC, Maďarsko. **Posledná revízia textu:** január 2019 (Milurit 100 mg a 300 mg), marec 2019 (Milurit 200 mg). **Výdaj lieku je viazaný na lekárske predpis.** Pred predpisávaním lieku si pozorne prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Úplná informácia o lieku na vyžiadanie.

Vysvetlivky: * SZ – srdcové zlyhanie, CHSZ – chronické srdcové zlyhanie, KM – kyselina močová, KV – kardiovaskulárny, ACEI/ARB – blokátory pre renín-angiotenzinový systém; BB – betablokátory; AB – aldosterónový blokátor

Literatúra: 1. G. Mancía, B. Williams, et al.: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension; European Heart Journal (2018) 39, 3021-3104;

2. L. Tamariz et al.: Uric acid as a predictor of all-cause mortality in Heart Failure: A meta-analysis; <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1751-7133.2011.00200.x>

Sekcia sestier bude vysielaná on-line v náhradnom termíne
o termíne vás budeme včas informovať

III. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedať: Petra Sekulová, Zuzana Gavalierová

- **Je zdravotná gramotnosť našich pacientov vyhovujúca?** • Abstrakt č. 63
I. Balážová, M. Belovičová, P. Matula
- **Školská sestra a význam jej pôsobenia v škole** • Abstrakt č. 64
M. Popovičová
- **Meranie ABI v prevencii amputácie dolných končatín** • Abstrakt č. 65
D. Hajnalová, I. Stoličná, K. Dostálová, L. Kukučková, Š. Moricová, K. Gazdíková
- **Venózný tromboembolizmus a hormonálna antikoncepcia** • Abstrakt č. 66
K. Dostálová, D. Hajnalová, I. Stoličná, L. Kukučková, Š. Moricová
- **Význam samovyšetovania semenníkov v prevencii onkologických ochorení**
M. Rydzoň, A. Ševčovičová
- **Následná starostlivosť o stomikov ako problém ošetrovateľskej praxe na Slovensku**
M. Molnárová, A. Ševčovičová

IV. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedať: Petra Sekulová, Zuzana Gavalierová

- **KPR v ambulancii všeobecného lekára**
E. Kohiar, J. Kohiarová
- **Odvrátiteľné úmrtia, úloha všeobecného lekára pre dospelých**
• Abstrakt č. 67
A. Fathi, Z. Mačudová, Z. Gavalierová
- **Činnosť a vízie Sekcie ambulantlych sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA** • Abstrakt č. 68
Z. Gavalierová, P. Sekulová, A. Mlynarčíková, D. Richnáková, R. Suranovská

Rytmonorm SR®

(propafenóniumchlorid s predĺženým uvoľňovaním)

keď je bezpečnosť dôležitá¹



Dávkovanie len 2 krát denne¹



Nastavenie ambulantnej liečby
aj bez hospitalizácie¹



Oddialenie rekurencie
symptomatických predsieňových arytmií
preukázané v štúdiách RAFT a ERAFT¹



Jediná SR forma
propafenónu na Slovensku²

Rytmonorm SR 225 mg

Rytmonorm 325 mg bez doplatku²

Rytmonorm SR 425 mg



Skrátaná informácia o lieku:

Názov lieku: Rytmonorm SR 225 mg, 325 mg, 425 mg. **Zloženie:** 225, 325, 425 mg propafenóniumchloridu v 1 kapsule s predĺženým uvoľňovaním. **Terapeutické indikácie:** Rytmonorm SR (riadené/predĺžené uvoľňovanie) je indikovaný na oddialenie rekurencie symptomatických predsieňových arytmií u pacientov bez signifikantného štruktúrneho ochorenia srdca a so symptomatickou fibriláciou predsieni v anamnéze. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Dávka Rytmonormu SR sa určuje na základe individuálnej odpovede a tolerance pacienta. Odporúča sa začať liečbu 225 mg propafenóniumchloridu v každých dvanásti hodinách. Dávka sa môže zvýšiť po minimálne piatich dňoch na 325 mg propafenóniumchloridu a po ďalších minimálne piatich dňoch sa môže zvýšiť až na 425 mg podávaných každých dvanásť hodín. Priame porovnanie propafenóniumchloridu v kapsulách s predĺženým uvoľňovaním a propafenóniumchloridu v tabletoch s okamžitým uvoľňovaním sa neštudovalo v klinických skúškach. Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene: Z dôvodu zvýšenej biologickej dostupnosti a zvýšenej počasu eliminácie propafenónu je potrebné zvážiť zníženie odporúčanej dávky. Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek: eliminácia hlavného metabolitu propafenónu je ovplyvnená poruchou funkcie obličiek, preto je potrebné podávať Rytmonorm SR týmto pacientom s opatnosťou. Starší pacienti nepozorovali sa žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti alebo v účinnosti u tejto populácie pacientov. U týchto pacientov sa má titrácia dávky vykonať so zvláštnou opatnosťou. Rytmonorm SR sa neštudoval u detí a dospievajúcich. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo alebo na zložku lieku, známy Brugadaov syndróm, signifikantné štruktúrne ochorenie srdca ako infarkt myokardu v priebehu posledných 3 mesiacov, nekompenzované kongestívne zlyhanie srdca s systolickou frakciou menšou ako 35 %, kardogénny šok, pokiaľ nie je zapríčinený arytmiou, ťažká symptomatická bradykardia, dystonická sinusová uzla, poruchy atriolatriálneho vedenia, AV blokáda druhého alebo vyššieho stupňa, blokáda zväzku ramienok alebo distálna blokáda bez zavedeného kardiostimulátora; ťažká hypotenzia, manifestná nerovnováha elektrolytov (napr. poruchy metabolizmu draslíka), ťažká obštrukčná choroba pľúc, myasthenia gravis, súbežná liečba ritonavírom. **Špeciálne upozornenia:** liek môže zmeniť dráždivosť aj citlivosť kardiostimulátora. **Liekové a iné interakcie:** Lieky inhibujúce CYP2D6, CYP1A2 a CYP3A4 napr. ketokonazol, cimetidin, chinidín. U pacientov, ktorí súčasne užívajú perorálne antikoagulanty (napr. fenpropukon, warfarín), sa odporúča pozorne monitorovanie parametrov zrážania krvi, pretože propafenón môže zvyšovať plazmatické hladiny týchto liekov s následným predĺžením protrombínového času. Dávky týchto liekov majú byť v prípade potreby upravené. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Neexistujú žiadne adekvátne a dobre kontrolované štúdie u tehotných žien. Propafenón sa môže používať v tehotenstve len ak potenciálny prínos prevyšuje možné riziko pre plod. Je známe, že propafenón prechádza u ľudí placentárnou bariérou. Koncentrácia propafenónu v pupočnici je asi 30 % v porovnaní s krvou matky. Laktácia Vylučovanie propafenónu do ľudského materského mlieka sa neštudovalo. Obmedzené údaje naznačujú, že propafenón sa môže vylučovať do materského mlieka. Propafenón sa má u dojčiacich matiek používať s opatnosťou. **Nežiaduce účinky:** závrat, poruchy srdcového vedenia, palpácia, úzkosť, poruchy spánku, bolesť hlavy, porucha chuti, rozmazané videnie, sinusová bradykardia, bradykardia, tachykardia, atď. **Učinnosť:** Účinnosť lieku je závislá na lekárskej predpis. **Uchovávanie:** do 30°C. **Balenie:** 20, 50, 60 a 100 kapsúl nie všetky balenia musia byť dostupné na trhu. **Registračné číslo:** 13/0310/05-S-13/0308/05-S-13/0309/05-S. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** TS Pharma s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica. **Dátum revízie textu:** 01/2018. Informácie určené pre odbornú verejnosť. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyzhľadanie, alebo na portáli www.sukl.sk. Pred predpisovaním alebo vydávaním lieku sa obozrňte s úplným súhrnom charakteristických vlastností lieku.

Použitá literatúra:

1. SPC Rytmonorm SR 225,325,425 mg revízia textu 01/2018
2. <https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202007>

BGP Products s.r.o., Karadžičova 10,
821 08 Bratislava, Slovensko
Tel: +421 2 40 203 800.
www.mylansk.sk



41. výročná konferencia SSVPL

POĎAKOVANIE SPONZOROM

ZLATÍ SPONZORI



STRIEBORNÍ SPONZORI



SPONZORI



PODUJATIE PODPORILI

