

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL



**Vás pozýva na najväčšie odborné podujatie
všeobecných lekárov na Slovensku**

43.

výročná konferencia SSVPL

13. – 15. október 2022

Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec

www.ssvpl.sk

www.idl.sk


PROGRAM



KLACID®

CLARITHROMYCIN

Pre každého pacienta čo potrebuje



Zdroj: Darkes MJ, Perry CM. Clarithromycin extended-release tablet: a review of its use in the management of respiratory tract infections. Am J Respir Med. 2003;2(2):175-201.

Skrátaná informácia o lieku
Názov lieku: KLACID 500 mg filmom obalené tablety. **Zloženie:** každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg klaritromycínu. **Pomocná látka so známym účinkom:** sodík, 1 filmom obalená tableta obsahuje 6,1 mg sodíka. **Terapeutické indikácie:** KLACID je indikovaný na liečbu infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na klaritromycín. K týmto infekciám patria: infekcie dolných dýchacích ciest (napr. bronchitída, pneumónia), infekcie horných dýchacích ciest (napr. faryngitída, sinusitída), infekcie kože a mäkkých tkanív (napr. folikulitída, celulitída, eryzpel), diseminované alebo lokalizované mykobakteriálne infekcie vyvolané *Mycobacterium avium* alebo *Mycobacterium intracellulare*, lokalizované infekcie vyvolané *Mycobacterium chelonae*, *Mycobacterium fortuitum* alebo *Mycobacterium kansasii*, prevencia diseminovanej infekcie vyvolanej *Mycobacterium avium* komplex (MAC) u pacientov s infekciou HIV s počtom lymfocytov CD4 < 100/u, eradikácia *Helicobacter pylori* v kombinácii s liekmi potlačujúcimi aciditu s následným znížením recidívy duodenálneho vredu, liečba odontogénnych infekcií. Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania pre správne používanie antibakteriálnych liečiv. KLACID SR je indikovaný na liečbu dospelých a detí starších ako 12 rokov. **Dávkovanie a spôsob podávania:** odporúčaná dávka klaritromycínu pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov je 250 mg 2-krát denne. Pri ťažších infekciách sa môže dávka zvýšiť na 500 mg 2-krát denne. Zvyčajná dĺžka liečby je 5 až 14 dní, okrem pneumónie získanej v komunite a sinusitídy, ktoré vyžadujú 6 až 14-dňovú liečbu. Keďže tablety KLACIDU s obsahom 250 mg klaritromycínu nie sú dostupné, v prípade potreby sa má použiť iný vhodný liek vo vhodnej liekovej forme. Odporúčaná dávka u dospelých s mykobakteriálnymi infekciami je 500 mg 2-krát denne. **Pacienti s poruchou funkcie obličiek:** (klírens kreatinínu nižší ako 0,5 ml/s) je potrebné dávku klaritromycínu znížiť na polovicu, t. j. 250 mg 1-krát denne alebo pri ťažších infekciách 250 mg 2-krát denne. U týchto pacientov nemá liečba presahnúť 14 dní. **Kontraindikácie:** precitlivosť na klaritromycín, iné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Súbežné podávanie liečiv obsahujúcich cisaprid, domperidón, pimozid, terfenadín je kontraindikované, pretože môže viesť k predĺženiu QT intervalu a srdcovým arytmiám, vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a *torsades de pointes*. Súbežné podávanie s tikagrelom alebo ranolazolom, s ergotamínom alebo dihydroergotamínom, s midazolámom, statínmi, lovastatínom, simvastatínom, kolchicínom, lomítapídom u pacientov s anamnézou predĺženého QT intervalu a s poruchou elektrolytov; u pacientov ktorí majú závažné zlyhávajúce pečene v kombinácii s poruchou funkcie obličiek. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** u gravidných žien treba zvážiť pomer prínosu a rizika, najmä počas prvých troch mesiacov gravidity. Počas užívania klaritromycínu boli hlásené prípady poruchy funkcie pečene. Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a iných ototoxických liečiv, predovšetkým aminoglykozidov, je potrebná opatnosť. Počas liečby a po jej ukončení sa má sledovať funkcia sluchu a vestibulárneho aparátu. Klaritromycín sa má používať s opatnosťou u pacientov s ischemickou chorobou srdca, závažnou srdcovou nedostatočnosťou, poruchami vodivého systému srdca alebo klinicky významnou bradykardiou, u pacientov, ktorí súbežne užívajú iné lieky spojené s predĺžením QT intervalu okrem tých, ktoré sú kontraindikované. Vzhľadom na vznikajúcu rezistenciu na *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* a *Streptococcus pyogenes* je potrebné vykonať testy citlivosti. Pri súbežnom užívaní perorálnych antidiabetík sa odporúča dôkladné sledovanie hladiny glukózy a pri súbežnom užívaní perorálnych antikoagulantov sa majú pravidelne sledovať hodnoty INR a protrombínového času. **Liekové a iné interakcie:** astemizol, cisaprid, domperidón, pimozid a terfenadín, ergotamín/dihydroergotamín, midazolam perorálne, lomítapid, inhibitory HMG-CoA redukáz (statíny). Liečivá ovplyvňujúce koncentráciu cirkulujúceho klaritromycínu: rifampín, fenofibrát, karbamazepín, fenobarbital, lubovník bodkovaný, efavirenz, nevirapín, rifabutin a rifapentín, etravirín, flukonazol, ritonavir. **Nežiaduce účinky:** bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie a porucha vnímania chuti. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Mylan IRE Healthcare Limited, Írsko. **Registračné číslo:** 15/0215/00-S. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. **Dátum revízie textu:** 11/2021. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SUKL) <http://www.sukl.sk>.

Skrátaná informácia o lieku
Názov lieku: KLACID SR, 500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním. **Zloženie:** Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 500 mg klaritromycínu. **Pomocné látky so známym účinkom:** laktóza, sodík. 1 tableta obsahuje 115 mg laktózy a 15,3 mg sodíka. **Terapeutické indikácie:** Na liečbu infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na tento liek. Infekcie dolných dýchacích ciest (napr. bronchitída, pneumónia), infekcie horných dýchacích ciest (napr. faryngitída, sinusitída), infekcie kože a mäkkých tkanív (napr. folikulitída, celulitída, eryzpel), je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania pre správne používanie antibakteriálnych liečiv. KLACID SR je indikovaný na liečbu dospelých a detí starších ako 12 rokov. **Dávkovanie a spôsob podávania:** 500 mg (1 tableta) 1-krát denne spolu s jedlom. U závažnejších infekcií 1 000 mg (2 tablety) 1-krát denne. Zvyčajná dĺžka liečby je 5 až 14 dní, okrem pneumónie získanej v komunite a sinusitídy, ktoré vyžadujú 6 až 14-dňovú liečbu. **Liečba odontogénnych infekcií:** 500 mg 1-krát denne počas 5 dní. **Pacienti s poruchou funkcie obličiek:** (klírens kreatinínu nižší ako 0,5 ml/s) u týchto pacientov sa nesmie používať. **Spôsob podávania:** tablety sa užívajú s jedlom, celé, nerozhrýznuté a nerozbité. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na klaritromycín, iné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Súbežné podávanie liečiv astemizol, cisaprid, domperidón, pimozid, terfenadín je kontraindikované, pretože môže viesť k predĺženiu QT intervalu a srdcovým arytmiám, vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a *torsades de pointes*. Súbežné podávanie s tikagrelom alebo ranolazolom, s ergotamínom alebo dihydroergotamínom, s midazolámom, u pacientov s hypokaliémiou, lovastatínom alebo simvastatínom, kolchicínom, u pacientov, ktorí majú závažné zlyhávajúce pečene v kombinácii s poruchou funkcie obličiek. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** U gravidných žien treba zvážiť pomer prínosu a rizika, najmä počas prvých troch mesiacov gravidity. Pacientov treba upozorniť, aby ukončili liečbu a vyhľadali svojho lekára, ak sa u nich objavia prejavy a príznaky ochorenia pečene ako je anorexia, žltka, tmavý moč, pruritus alebo citlivosť brucha na dotyk. Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a iných ototoxických liečiv, predovšetkým aminoglykozidov, je potrebná opatnosť. Počas liečby a po jej ukončení sa má sledovať funkcia sluchu a vestibulárneho aparátu. Pacienti, ktorým sa súbežne podávajú lieky, ktoré indukujú enzým CYP3A4, majú klaritromycín užívať s opatnosťou. Je potrebné venovať pozornosť možnosti vzniku rezistencie medzi klaritromycínom a inými linkosamínmi. **Liekové a iné interakcie:** cisaprid, domperidón, pimozid, astemizol a terfenadín, ergotamín/dihydroergotamín, midazolam perorálne, inhibitory HMG-CoA redukáz (statíny), efavirenz, nevirapín, rifampín, rifabutin a rifapentín, etravirín, flukonazol, ritonavir, interakcie založené na CYP3A. Aminoglykozidy, digoxín, zidovudín, fenofibrát, valproát, itraconazol, blokátory kalciového kanála (verapamil, amlodipín, diltiazem). **Nežiaduce účinky:** bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie a porucha vnímania chuti. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Mylan IRE Healthcare Limited, Írsko. **Registračné číslo:** 15/0141/99-S. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. **Dátum revízie textu:** 06/2021. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SUKL) <http://www.sukl.sk>.

Dátum aktualizácie materiálu august 2022.
Viatris Slovakia, Bottova 2A, Bratislava
www.viatris.com

Viatris Connect



www.viatrisconnect.sk



VIATRIS

43. výročná konferencia SSVPL



OBSAH

PRÍHOVOR PREZIDENTA SSVPL	4
PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY SEKCIE AMBULANTNÝCH SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SK SaPA	5
VEDECKÝ ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONFERENCIE	6
KONTAKTY	6
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	7
ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV	10
PLÁN KONFERENČNÝCH PRIESTOROV / PLOCHY VYSTAVOVATEĽOV	12
PREHLADNÝ PROGRAM	14
ODBORNÝ PROGRAM	20
ODBORNÉ VZDELÁVANIE PRE SESTRY	38
WORKSHOPY	40
POĎAKOVANIE SPONZOROM	52

43. výročná konferencia SSVPL 13. - 15. 10. 2022

PROGRAM

ISBN 978-80-974283-2-7



PRÍHOVOR

Za posledné tri roky sme si to vyskúšali všelijako, ale musím oceniť, že vždy nanajvýš kreatívne. Nielen preto, aby sme neprerušili tradíciu a kontinuitu výročných konferencií, ale najmä preto, že aj v najťažších podmienkach našej práce sme cítili potrebu vzdelávať sa, vymieňať si skúsenosti a najmä, ľudsky sa stretávať.

A nové podmienky nás naučili novým skúsenostiam – v histórii našej odbornej spoločnosti sme sa po prvýkrát, ale v prekvapivom počte stretli na konferencii najskôr virtuálne, ďalší rok sme ju po prvýkrát zorganizovali hybridnou formou. Tento rok sa však opäť v rámci organizácie najväčšieho odborného podujatia všeobecných lekárov na Slovensku vraciame – určite všetci s úľavou – do „starých kolají“, ale do sveta nových poznatkov a informácií, ktoré odznejú v rámci bohatého odborného programu.

Tri dni 43. výročnej konferencie SSVPL, ktoré nás čakajú sú doslova „nabité“ odbornými prednáškami, diskusiami a workshopmi, vedenými nielen členmi našej spoločnosti, ale aj kolegami z iných odborných spoločností. Zaujímavý program je pripravený aj v sesterskej sekcii a sme radi, že svoj priestor majú vyhradený aj Mladí praktici. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí prijali pozvanie k aktívnej účasti na konferencii, spolupracovníkom, ktorí už dlhodobo spoľahlivo zabezpečujú jej technické zázemie, ale aj sponzorom vďaka, ktorým sa môže konferencia konať. A samozrejme aj všetkým účastníkom konferencie.

Náš každoročný jesenný návrat do Horného Smokovca je pre mnohých z nás už ako návrat domov. Ako vo filme Kosenie Jastrabej lúky. Vieme, že okrem kusu práce, nás čakajú milé a obohacujúce stretnutia so spriaznenými ľuďmi, ktorých dnes spája už trochu viac ako len rovnaká profesia. A vždy sme pripravení do našej veľkej lekárskej „famílie“ prijať aj novoprichádzajúcich.

Stretnutie v Tatrách nám každý rok v stereotyp celoročnej práce dovoľí nielen vydýchnuť si a potom sa zhlboka nadýchnuť čerstvého vzduchu, ale aj potvrdiť si, že to, čo v ambulanciách pre pacientov robíme, má – tak ako vrcholy hôr okolo nás – obrovský zmysel. Ale vďaka vzdelávaniu je stále priestor na to posúvať sa ďalej a usilovať sa robiť našu prácu ešte lepšie.

Milí kolegovia, priatelia, účastníci konferencie, prajem Vám všetkým, aby ste si tieto tri dni užili po odbornej, kultúrnej, ale aj ľudskej stránke naozaj naplno.

S úctou MUDr. Peter Makara, MPH
prezident SSVPL

PRÍHOVOR



Po rokoch pôsobenia v zdravotníctve si pomaly zvykám na slová dlhodobý nedostatok sestier, a to naprieč ambulantnou ako i ústavnou starostlivosťou. Oblasť zanedbaná politikmi a kompetentnými inštitúciami. Ale nikdy si nezvyknem na slovo nevzdelaný zdravotnícky pracovník – lekár/sestra. Pacient nám zveruje do rúk svoje zdravie a to si zaslúži tú najlepšiu starostlivosť. Na to, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná

v najvyššej možnej kvalite, je potrebné vzdelávať sa aktuálnymi recenzovanými informáciami. Aktivity sústavného vzdelávania ponúkajú možnosť si nové informácie nielen osvojiť, ale ich aj rozšíriť interdisciplinárne.

Dnes máme možnosť spoločne s ambulantnými lekármi si vypočúť prezentácie na slovo vzatých odborníkov, a tak si osvojiť informácie potrebné pre každodennú prax, aby sme dokázali reagovať na dynamické zmeny v oblasti medicíny a ošetrovateľstva. Preto Vás sestry srdečne pozývam na každoročné odborné podujatie akým je konferencia SSVPL.

Záverom si dovoľím pripomenúť múdre slová indického filozofa, politika a najmä veľkého mysliteľa – Mahátmu Ghándího o význame vzdelávania sa: „Tvoje myšlienky sa stávajú tvojimi slovami... tvoje slová sa stávajú tvojimi činmi..., tvoje činy sa stávajú tvojimi zvykmi..., tvoje zvyky sa stávajú tvojimi hodnotami..., tvoje hodnoty sa stávajú tvojím osudom“.

Ešte raz ste pozvaní a budem veľmi rada, ak v budúcnosti budete medzi aktívnymi účastníkmi.

PhDr. Zuzana Gavalerová, MPH
Predseda Odbornej sekcie ambulantných sestier
a pôrodných asistentiek SK SaPA

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Prezident konferencie

MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor

MUDr. Peter Makara, MPH prezident
MUDr. Peter Lipovský viceprezident
MUDr. Bendová Jana, PhD., MPH, MBA vedecký sekretár
MUDr. Katarína Kováčová predseda mladých praktikov

Vedecký výbor konferencie

Prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD.
MUDr. Bendová Jana, PhD., MPH, MBA
MUDr. Blahová Beáta, PhD.
MUDr. Dostálová Katarína, PhD., MPH
Prof. MUDr. PhDr. Kalanin Peter, PhD.
MUDr. Kaňuch Ján
MUDr. Kováčová Katarína
Prof. MUDr. Krištúfková Zuzana, PhD. MPH
MUDr. Lipovský Peter
MUDr. Macháčová Michaela
MUDr. Makara Peter, MPH
MUDr. Matusová Mária
Doc. MUDr. Minárik Peter, PhD., MSc.
Doc. PharmDr. Mináriková Daniela, PhD., MSc.
MUDr. Ostrovská Soňa
MUDr. Pekarovič Peter
MUDr. Resutíková Ľudmila
MUDr. Šimková Adriana, PhD.

Kontakty

Odborný program:
MUDr. Peter Makara, MPH
E-mail: prezident.ssvpl@ssvpl.sk

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie



I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
mobil: +421 918 569 890

Kontaktná osoba:
Marcela Idbeková, mobil: +421 918 569 890
e-mail: marcela.idlbekova@idl.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania

Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

Účastnícke poplatky

	Úhrada do 30.06.2021	Úhrada po 30.6.2021	Úhrada na mieste	Úhrada on-line sledovanie
LEKÁRI				
členovia SSVPL*	50 €	60 €	70 €	145 €
nečlenovia SSVPL	100 €	110 €	120 €	145 €
Mladý praktik	25 €	30 €	35 €	72,50 €
SESTRY a MTP				
členky SKSaPA alebo MTP	20 €	25 €	30 €	60 €
nečlenky SKSaPA a MTP	25 €	30 €	35 €	60 €
prednášatelia, študenti a nepracujúci dôchodcovia	0 €	0 €	0 €	0 €

* Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní
v členskej databáze SSVPL a majú uhradený ročný členský poplatok.

Úhrada registračných poplatkov - prezenčná forma

Platba bankovým prevodom na účet I.D.L. Company s.r.o.
IBAN SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT GIBASKBX
Variabilný symbol: 102022
Špecifický symbol: ID SLK, SKSaPA alebo SK MTP účastníka

Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry,
ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

Úhrada registračných poplatkov - on-line forma

Platba kartou priamo pri registrácii.

Účastnícky poplatok je nevratný.

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite
fakturačné údaje na ekonom@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr
posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály
konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.

Postery

Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

Kreditové hodnotenie

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, SKSaPA a SK MTP.

Účastníci kongresu dostávajú za jednotlivé dni nasledujúci počet kreditov:

LEKÁRI

Štvrtok	13. 10. 2022	8 kreditov
Piatok	14. 10. 2022	8 kreditov
Sobota	15. 10. 2022	5 kreditov



Aktívna účasť

Autor prednášky	10 kreditov
Prví dvaja spoluautori	5 kreditov

SESTRY a MTP

Štvrtok	13. 10. 2022	8 kreditov
Piatok	14. 10. 2022	8 kreditov
Sobota	15. 10. 2022	5 kreditov



Aktívna účasť

Autor prednášky	10 kreditov
Prví dvaja spoluautori	5 kreditov

Potvrdenie o účasti

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Registrácia

Štvrtok	13. 10. 2022	– Grandhotel Bellevue (lekári/sestry)	od 7:30 h
Piatok	14. 10. 2022	– Grandhotel Bellevue (lekári/sestry)	od 7:30 h
Sobota	15. 10. 2022	– Grandhotel Bellevue (lekári)	od 7:30 h
		Grandhotel Starý Smokovec (sestry)	od 7:30 h

Upozornenie:

Registrácia sestier bude v sobotu prebiehať iba v hoteli Grandhotel Starý Smokovec. Z dôvodu uznania kreditov je nutné podpísať sa na prezenčnú listinu (sestry/MTP) a prejsť elektronickou registráciou (lekári/sestry/MTP) každý deň


Chráni a regeneruje



Pre pacientov s poškodením pečene a s chronickými zápalovými ochoreniami pečene alebo pečeňovou cirkhózou.¹

- Chráni pečeň¹
- Regeneruje¹
- Chráni pred oxidačným stresom¹
- Neobsahuje laktózu¹

Podpora
Zdravia
pečene originálnym
silymarínom



SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Názov lieku: Legalon 140, Legalon 70, kapsuly. **Zloženie:** Jedna kapsula obsahuje 173,0 - 186,7 mg suchého extraktu z plodov rastliny pestrec mariánsky (*Silybum marianum*), čo zodpovedá 140 mg silymarínu (extraktácie činidlo: etylacetát > 96,7 %), resp. 86,5 - 93,3 mg suchého extraktu z plodov rastliny pestrec mariánsky (*Silybum marianum*), čo zodpovedá 70 mg silymarínu (extraktácie činidlo: etylacetát > 96,7 %). **Pomocná látka so známym účinkom:** Jedna kapsula obsahuje 0,4494 mg sodíka, resp. 0,2260 mg sodíka. **Terapeutické indikácie:** Legalon 140: Toxické poškodenie pečene; podporná liečba u pacientov s chronickými zápalovými ochoreniami pečene alebo pečeňovou cirkhózou. Legalon 70: Toxické poškodenie pečene; podporná liečba pri chronickej hepatitíde alebo pri cirkhóze pečene. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Legalon 140: Pokiaľ lekár neurčí inak, na začiatku liečby a vo vážnych prípadoch sa podáva 1 kapsula 3-krát denne. Udržiavacia dávka je 1 kapsula 2-krát denne. Legalon 70: Pokiaľ lekár neurčí inak, na začiatku liečby uvedených indikácií a pri závažných stavoch sa podávajú 2 kapsuly 3-krát denne. Udržiavacia dávka je 1 kapsula 3-krát denne. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na silymarín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Legalon 140 / Legalon 70. **Špeciálne upozornenia:** Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v kapsule, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka. Legalon 70: Liek sa neodporúča deťom mladším ako 12 rokov, kvôli nedostatku klinických súkoseností pri podávaní v týchto vekových skupinách. Liečba Legalonom je prospešná, len ak je prerušené pôsobenie toxického látky vyvolávajúce poškodenie pečene (napr. alkohol). **Liekové a iné interakcie:** Nie sú známe. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Súkosenosti týkajúce sa použitia Legalonu 140, resp. Legalonu 70 počas gravidity a dojčenia nie sú k dispozícii. Z tohto dôvodu ho má lekár predpisovať, iba ak existujú jednoznačné dôvody na jeho použitie. **Odpovedanie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** nie je známe. **Nežiaduce účinky:** Legalon 140: Príležitostne bol zaznamenaný mierny laxatívny účinok, gastrointestinálne poruchy, výnimočne alergické reakcie. Legalon 70: Vzácné bol zaznamenaný mierny laxatívny účinok. **Uchovávanie:** nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. **Balenie:** Legalon 140: balenie obsahuje 20, 30, 50, 60 a 100 kapsúl, klinické balenie 2000 kapsúl (20 x 100). Legalon 70: Veľkosť balenia: 30, 60, 100 kapsúl. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. **Registračné číslo:** Legalon 140: 80/0342/01-S, Legalon 70: 80/0294/94-S. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Mylan IRE Healthcare Limited, Unit 35/36, Grange Parade, Baldry Industrial Estate, Dublin 13, Írsko. **Dátum poslednej revízie textu:** 10/2018. **Informácia je určená pre odbornú verejnosť. Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku.** Úplná informácia o lieku je dostupná na vyžiadanie a na stránke www.sukl.sk. **Spôsob výdaja lieku:** viazaný na lekársky predpis.

Podpora literatúra: 1. SPC Legalon 140 a 70 mg, dátum revízie textu 10/2018.

Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, www.viatrix.com

05/2021/LEG/KB/02

MENNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV

firma / vystavovateľ	poschodie	číslo stánku
Aidian	-1. poschodie	16
Allmedical	-2. poschodie	9
Ambee	1. poschodie	10
Amgen	-1. poschodie	17
Angelini Pharma	1. poschodie	2
Axon Lab	-1. poschodie	8
Bausch Health Slovakia	-1. poschodie	18
Benela	-1. poschodie	15
Berlin-Chemie	1. poschodie	1
Biodrug	1. poschodie	5
Biohem	-2. poschodie	3
BTL Slovakia	-1. poschodie	6
COMPEK MEDICAL SERVICES	1. poschodie	11
Dôvera zdravotná poisťovňa	1. poschodie	9
Eurolab Lambda	-1. poschodie	14
Ewopharma	-2. poschodie	13
Gedeon Richter Slovakia	-1. poschodie	20
GL Pharma	-2. poschodie	6
h&h PARTNERS	1. poschodie	13
IBSA Slovakia s.r.o.	-1. poschodie	4
IDS Health Media Slovakia	-2. poschodie	11
KRKA SLOVENSKO	-1. poschodie	3
LyL – OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko	-2. poschodie	14
MED TRUST Slovakia	1. poschodie	4
MEDI PLUS SERVIS	1. poschodie	7
MERCK spol	-1. poschodie	19
Nadácia Lekár	-2. poschodie	4
Novo Nordisk Slovakia	-1. poschodie	13
Nutricia	-2. poschodie	10
One Pharma	-2. poschodie	5
Pfizer Luxembourg SARL	-1. poschodie	11
Pharmaselect SK	-1. poschodie	10
Raabe	-2. poschodie	15
RENOMIA	1. poschodie	14
Royal Water	1. poschodie	6
SANDOZ	-1. poschodie	9
Servier Slovensko	-1. poschodie	2
STADA Pharma Slovakia	-1. poschodie	5
Tvoja ambulancia	-2. poschodie	12
UNION	-2. poschodie	7
Viatrix	-1. poschodie	1
Všeobecná zdravotná poisťovňa	1. poschodie	12
Vydavateľstvo Osveta	1. poschodie	3
Woerwag	-1. poschodie	12
Work in Balance	-2. poschodie	8
Xantis Pharma	1. poschodie	8
Zentiva a.s.	-1. poschodie	7
ZEPTER SLOVAKIA	-2. poschodie	1

ACEi a ARB sú voľba v liečbe artériovej hypertenzie¹⁻⁷

PRENESA
perindopril

CO-PRENES
perindopril a indapamid



Wamlox®
amlodipin a valsartan



Valtricom®
amlodipin, valsartan
a hydrochlorotiazid

AMLESSA®
perindopril a amlodipín

CO-AMLESSA®
perindopril, indapamid a amlodipin

Teldipin[®]
telmisartan/amlodipin

[illegible][illegible][illegible]

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarjevska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovensko. **Predpisanim si prosím prežítajte úplnú informáciu o produkte (SPC). Určené osobám, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky. Úplnú informáciu o lieku získate na adrese:** KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava, www.krka.sk.

Literatura: 1.SPC Prenessa, 2.SPC Co-Prenessa, 3.SPC Amlessa, 4. SPC Co-Amlessa, 5. SPC, Wamlox, 6.SPC Valtrix, 7. SPC Teldipin.

Dátum prípravy materiálu: 9/2022.

Úplnú informáciu o lieku získate na adrese:

KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava
Tel. (02) 571 04 501, Fax (02) 571 04 502, www.krka.sk




STOJÍME PRI VÁS PRE ZDRAVIE

Abstract

PLÁN KONFERENČNÝCH PRIESTOROV / PLOCHY VYSTAVOVATEĽOV


1. poschodie / registrácia



-2. poschodie / obchod

- | | | |
|-----|-------|---------------------------|
| 1. | 2x1 m | ZEPTER SLOVAKIA |
| 2. | 2x1 m | ZEPTER SLOVAKIA |
| 3. | 2x1 m | Biohem |
| 4. | 2x1 m | Nadácia Lekár |
| 5. | 2x1 m | One Pharma |
| 6. | 2x1 m | GL Pharma |
| 7. | 2x1 m | UNION |
| 8. | 2x1 m | Work in Balance |
| 9. | 2x1 m | Allmedical |
| 10. | 2x1 m | Nutricia |
| 11. | 2x1 m | IDS Health Media Slovakia |
| 12. | 2x1 m | Tvoja ambulancia |
| 13. | 2x1 m | Ewopharma |
| 14. | 2x1 m | LyL |
| 15. | 2x1 m | Raabe |

← Slovenská reštaurácia
 ← Dámsky salónik



-1. poschodie



- | | | |
|-----|-----------|-------------------------|
| 1. | 6x2 m | VIATRIS |
| 2. | 5x2 m | Servier Slovensko |
| 3. | 5x2 m | KRKA SLOVENSKO |
| 4. | 3x2 m | IBSA Slovakia |
| 5. | 3x1 m | STADA Pharma Slovakia |
| 6. | 4x2 m | BTL Slovakia |
| 7. | 4x2 m | Zentiva |
| 8. | 3x2 m | Axon Lab |
| 9. | 4x2 m | SANDOZ |
| 10. | 4x2 m | Pharmaselect SK |
| 11. | 4x2 m | Pfizer Luxembourg SARL |
| 12. | 4x2 m | Woerwag |
| 13. | 4,5x2,5 m | Novo Nordisk Slovakia |
| 14. | 2,5x1,2 m | Eurolab Lambda |
| 15. | 2x1 m | Benela |
| 16. | 2x1 m | Aidian |
| 17. | 2x1 m | Amgen |
| 18. | 2x1 m | Bausch Health Slovakia |
| 19. | 3x2 m | MERCK |
| 20. | 4x2 m | Gedeon Richter Slovakia |

Štvrtok 13. 10. 2022

PREHLADNÝ PROGRAM

Sála	Sála Bellevue I.	Sála Bellevue II.	Sála Bellevue III.
8:00 – 9:00	ČO JE NOVÉ VO VYKAZOVANÍ VÝKONOV (WS)		
9:10 – 10:10	MLADÝ PRAKTIK		
10:20 – 11:20	LEGISLATÍVA A BEZPEČNOSŤ LEKÁRA PRE ROK 2022	BLOK SLOVENSKEJ PSYCHIATRICKEJ SPOLOČNOSTI SLS	
11:30 – 11:50	SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE, PRÍHOVORY HOSTÍ		
11:50 – 12:30	TÉMA REZEROVANÁ PRE MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR		

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30	AKTUÁLNY POHĽAD NA POLYMORBÍDNEHO PACIENTA <i>Blok podporený spoločnosťou Krka Slovensko, s. r. o.</i>	VARIA	AMBULANTNÝ SW, NCZI A SOCIÁLNA POISŤOVŇA. ČO ICH SPÁJA A ČO ROZDEĽUJE?
14:40 – 15:40	VENÓZNE OCHORENIA <i>Blok podporený spoločnosťou Servier Slovensko</i>	PRAKTICKÉ ASPEKTY MANAŽMENTU JEDINCOV ŽIJÚCICH S OBEZITOU <i>Blok Slovenskej obezitologickej asociácie</i>	PANELOVÁ DISKUSIA: ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE
15:50 – 16:50	CHRÁNIME NAŠICH PACIENTOV – DOSTATOČNE? <i>Sympóziu podporené spoločnosťou VIATRIS</i>	POST-COVID 19 OČAMI KARDIOLÓGA A INTERNISTU	KRÁTKE INTERVENCIE, MOTIVAČNÝ ROZHOVOR A TERAPEUTICKÁ EDUKÁCIA PACIENTA V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
17:00 – 18:00	CHOROBY PEČENE A PRAKTIK <i>Blok Slovenskej hepatologickej spoločnosti SHS</i>	AKO ZLEPŠIŤ KOMUNIKÁCIU LEKÁR-PACIENT. FENOTYPY PACIENTOV Z POHĽADU LEKÁRA MANAŽUJÚCEHO KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA A POSTOJ PSYCHIATRA <i>Sympóziu podporené spoločnosťou SERVIER</i>	VARIA

20:30

Diskusný večer SSVPL

Štvrtok 13. 10. 2022

WORKSHOPY

Sála	Salónik Krystal	Dámsky salónik	Salónik Gold
8:00 – 9:00			
9:10 – 10:10			
10:20 – 11:20			
11:30 – 12:30			

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30	AROMATERAPIA A JEJ VPLYV NA CELKOVÉ TELO A PSYCHIKU		
14:40 – 15:40	STABILIZÁTOR CIRKULÁCIE ENERGIE KRVÍ		
15:50 – 16:50	Detoxikácia a výživa organizmu prírodnými štavami, prírodná liečba boreliózy. Meranie jednotlivých systémov v tele EWS analyzátorom.		
17:00 – 18:00	PSYCHOSOMATICKÝ PRÍSTUP V MEDICÍNE		

Piatok 14. 10. 2022

PREHLADNÝ PROGRAM

Sála	Sála Bellevue I.	Sála Bellevue II.	Sála Bellevue III.
8:00 – 9:00	NEFARMAKOLOGICKÝ PRÍSTUP V PREVENCII A LIEČBE CHRONICKÝCH NEPRENOSNÝCH OCHORENÍ <i>Blok SAVP</i>	BLOK TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA	
9:10 – 10:10	B12 DEFICIENCIA V PRAXI – ČO SME MOŽNO NEVEDELI? <i>Blok podporený spoločnosťou Worwag</i>	BLOK PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE	TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO PRE NEŠPORTUJÚCEHO PACIENTA
10:20 – 11:20	EKG DIAGNOSTIKA V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA <i>Interaktívny workshop</i>	PRIMÁRNA PREVENCIA ZHUBNÝCH NÁDOROV PROBIOTIKÁ A ZHUBNÉ NÁDORY	KAM ĎALEJ S OČKOVANÍM PROTI COVID-19 <i>Blok podporený spoločnosťou Medison Pharma</i>
11:30 – 12:30	MALÝ KROK PRE CIEVY, VEĽKÝ KROK PRE KVALITU ŽIVOTA <i>Blok podporený spoločnosťou KRKA</i>	ONKOLOGICKÉ SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY	OČKOVANIE V KONTEXTE OCHRANY ZDRAVIA – MEDICÍNSKE A PRÁVNE ASPEKTY
12:30 – 13:30 Obed			
13:30 – 14:30	PANELOVÁ DISKUSIA: AK TO NEVIEME ODMERAŤ, NEMÔŽEME TO ZMENIŤ! DÔLEŽITOSŤ PREVENIE V PANDEMICKOM OBDOBÍ <i>Blok podporený spoločnosťou VIATRIS</i>	DERMATOLÓGIA	VARIA
14:40 – 15:40	MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA Charta 70/2023 – výsledky 2019–2022 <i>Blok Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti</i>		VARIA
15:50 – 16:50	NOVÁ ÉRA V LIEČBE OBEZITY V NAŠEJ PRAXI <i>Sympóziu podporené spoločnosťou Novo Nordisk</i>	PREČO JE ADHERENCIA K FARMAKOTERAPII DÔLEŽITÁ?	FIBRILÁCIA PREDISIENÍ A NOVÉ TRENDY V SRDCOVOM ZLYHÁVANÍ
17:00 – 18:00	OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽLÁZY <i>Blok podporený spoločnosťou MERCK</i>	ANGIOLOGICKÝ BLOK	TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

20:30 Diskusný večer SSVPL

Piatok 14. 10. 2022

WORKSHOPY

Sála	Salónik Krystal	Dámsky salónik	Salónik Gold	Telocvičňa
8:00 – 9:00				
9:10 – 10:10	Psychosomatický prístup v medicíne	9:10 – 10:40 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	TERAPIA POHYBOM <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 6 osôb</i>
10:20 – 11:20	Mikroimunoterapia v ambulatnej praxi	10:50 – 12:30 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 25 – 30 osôb</i>	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	
11:30 – 12:30	Synergia psycho-somatického a fyzioterapeutického prístupu pri (VAS)		DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	TERAPIA POHYBOM <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 6 osôb</i>
12:30 – 13:30 Obed				
13:30 – 14:30	“Budúcnosť bez dymu” Workshop podporený spoločnosťou Philip Morris	13:30 – 15:00 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 25 – 30 osôb</i>	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	ŠKOLA CHRBTÁ – plus <i>Kapacita: 30 osôb</i>
14:40 – 15:40	Komunitné pohybové aktivity a telemedicina – hľadáme nové riešenia starých problémov		DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	TERAPIA POHYBOM <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 6 osôb</i>
15:50 – 16:50	Klinický asistent na báze umelej inteligencie pre efektívnu diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení POWERFUL MEDICAL		DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	ŠKOLA CHRBTÁ – plus <i>Kapacita: 30 osôb</i>
17:00 – 18:00	SLEDOVANIE HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTOV U PL	Tvoja ambulancia združenie právnických osôb	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	TERAPIA POHYBOM <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 6 osôb</i>

Sobota 15. 10. 2022

PREHLADNÝ PROGRAM

Sála	Sála Bellevue I.	Sála Bellevue II.	Sála Bellevue III.
8:30 – 9:30	MANAŽMENT PACIENTA S OCHORENÍM KOLENNÉHO KLBU <i>Ortopedický blok</i>		
9:40 – 10:40	AKTUÁLNE POKROKY V PREVENCIÍ A LIEČBE INFEKČNÝCH OCHORENÍ <i>Blok podporený spoločnosťou Pfizer</i>	BLOK Kliniky všeobecného lekárstva UPJS LF a Nemocnice AGEL Košice Šaca, a. s.	
10:50 – 11:50	BLOK SLOVENSKEJ EPIDEMIOLOGICKEJ A VAKCINOLOGICKEJ A SPOLOČNOSTI (SEVS)	PREVENTÍVNA KARDIOLÓGIA. NOVÉ MOŽNOSTI V MANAŽMENTE PACIENTOV SO ZVÝŠENÝM KV RIZIKOM	
12:00 – 13:00	MODEROVANÁ DISKUSIA NA PÓDIU „ČAS NA OTÁZKY“ (QUESTION TIME) – ČLENSKÁ SCHÔDZA		

Sobota 15. 10. 2022

WORKSHOPY

Sála	Salónik Kristal	Dámsky salónik	Salónik Gold	Telocvičňa
8:30 – 9:30				
9:40 – 10:40				ŠKOLA CHRBTÁ – plus <i>Kapacita: 30 osôb</i>
10:50 – 11:50				
12:00 – 13:00				

SESTERSKÁ SEKCIA

Sobota 15. 10. 2022

Grandhotel Starý Smokovec

8:00 – 9:00	I. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
9:00 – 9:10	OTVORENIE KONFERENCIE
9:10 – 10:40	II. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK VŠZASP SV. ALŽBETY BRATISLAVA
11:00 – 12:00	III. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
12:00 – 14:00	IV. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

ODBORNÝ PROGRAM

Štvrtok 13. 10. 2022

Súčasťou každého bloku prednášok
je záverečná diskusia
nasledujúca po prednáškach

8:00 – 9:00 **ČO JE NOVÉ VO VYKAZOVANÍ VÝKONOV (WS)**

Predsedenstvo: Ľudmila Resutíková, Eva Hudobová

- Ako vykazovať výkony všeobecnej ambulancie, aby boli zdravotnými poisťovňami uhradené. Zmeny a novinky v roku 2022
E. Hudobová (Banská Bystrica), Ľ. Resutíková (Želovce)

9:00 – 9:10 **Prestávka**

9:10 – 10:10 **MLADÝ PRAKTIK**

Predsedenstvo: Peter Lipovský, Katarína Kováčová, Silvia Masaryková

- Digitálne zdravie
K. Kováčová (Šaľa)
- Zahraničné výmenné pobyty
S. Masaryková (Bratislava)
- 1 slide 5 minút – kazuistiky Mladých praktikov
S. Masaryková (Bratislava) a iní autori
- Záver bloku: Vylosovanie výhercu o vstup na hlavnú WONCA konferenciu v Bruseli 2023
– súťaž kazuistik Mladých Praktikov

10:10 – 10:20 **Prestávka**

10:20 – 11:20 **LEGISLATÍVA A BEZPEČNOSŤ LEKÁRA PRE ROK 2022**

Predsedenstvo: Peter Makara, JUDr. Ivan Humeník

- Legislatívna cesta VLD počas 2021/2022
P. Makara (Snina), I. Humeník (Košice)
- Ako nechať systém pracovať za lekára a ochrániť tým svoju ambulanciu (Cenník–Zmluvné podmienky ambulancie–Informované súhlasy)
I. Humeník (Košice)
- Komplexné poistenie VLD: Novinky a skúsenosti
H. Ihnát (Košice)

11:20 – 11:30 **Prestávka**

11:30 – 11:50 **SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE, PRÍHOVORY HOSTÍ**

11:50 – 12:30 **TÉMA REZEROVANÁ
PRE MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR**

12:30 – 13:30 **Obed**

13:30 – 14:30 **AKTUÁLNY POHĽAD NA POLYMORBÍDNEHO PACIENTA**

Predsedenstvo: Peter Lipovský

Blok podporený spoločnosťou KRKA

- Antibiotická liečba infekcií dýchacích ciest
K. Šimeková (Martin)
- Bod, z ktorého niet návratu – dôležitosť včasnej a komplexnej liečby
I. Šoóšová (Bratislava)
- Odlep sa! Nedostatok pohybu, dôsledky a potreba farmakologickej liečby
I. Rybár (Piešťany)

14:30 – 14:40 **Prestávka**

14:40 – 15:40 **VENÓZNE OCHORENIA**

Predsedenstvo: Jana Bendová

Blok podporený spoločnosťou SERVIER

- CHVO – postup liečby z pohľadu všeobecného lekára
J. Bendová (Veľký Biel)
- Aktuálna situácia v ambulancii všeobecného lekára – skrining CHVO
M. Jenčo (Streda nad Bodrogom) **Abstrakt č. 1**
- Pozitívny TOKS. Čo ďalej s pacientom?
M. Pješčák (Stará Ľubovňa)

15:40 – 15:50 **Prestávka**

15:50 – 16:50 **CHRÁNIME NAŠICH PACIENTOV – DOSTATOČNE?**

Predsedenstvo: Zuzana Krištúfková, Michaela Macháčová

Sympóziu podporené spoločnosťou VIATRIS

- Chránime našich pacientov – očkujeme proti chrípke
Z. Krištúfková (Bratislava)
- Klaritromycín – vieme kedy, komu, aký?
M. Macháčová (Topoľčany)
- „Novodobá pandémie“ – steatóza pečene
R. Juríček (Bratislava)

Sála Bellevue I.

Sála Bellevue I.

Sála Bellevue I.

Sála Bellevue I.

Sála Bellevue I.

Sála Bellevue I.

Sála Bellevue I.

Sála Bellevue I.

ODBOBNÝ PROGRAM

16:50 – 17:00 Prestávka

17:00 – 18:00 BLOK HEPATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI Choroby pečene a praktik

Predsedenstvo: Peter Jarčuška, Peter Makara, Ľubomír Skladaný

- SIRIUS – aktuálne informácie o priebehu
Ľ. Skladaný (Banská Bystrica) P. Jarčuška (Košice)
- SIRIUS VPL
P. Makara (Snina)
- „Ultraprocessed food, pečeň a zdravie“
M. Rác (Nitra)
- Poškodenie pečene v tehotenstve: kedy je dôvod na paniku?
S. Dražilová (Košice)

20:30 Diskusný večer SSVPL

Štvrtok 13. 10. 2022

Sála Bellevue II.

10:20 – 11:20 BLOK SLOVENSKEJ PSYCHIATRICKEJ SPOLOČNOSTI SLS

Predsedenstvo: Niké Makarová, Jozef Dragašek

- Detektívka v psychiatrii – spolupráca je kľúčová **Abstrakt č. 2**
S. Žofčáková (Košice)
- Superdialhica črevo-mozog: Čo by sme mali my a naši pacienti o nej vedieť?
J. Dragašek (Košice), Z. Vančová (Košice) **Abstrakt č. 3**
- Na sexe záleží: Ako správne vyberať antidepresívum? **Abstrakt č. 4**
Z. Vančová (Košice), J. Dragašek (Košice)

Sála Bellevue II.

13:30 – 14:30 VARIA

Predsedenstvo: Peter Pekarovič

- „Aktuální postupy v profylaxi dnových záchvatů“ **Abstrakt č. 5**
P. Němec (Brno)
Prednáška podporená spoločnosťou Pharmaselekt SK
- Aceklofenak v liečbe reumatických ochorení – účinný aj bezpečný
R. Stančík (Piešťany) **Abstrakt č. 6**
Prednáška podporená spoločnosťou Gedeon Richter Slovakia
- Súčasné trendy liečby obezity v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých **Abstrakt č. 7**
T. Varga (Veľké Kapušany)
Prednáška podporená spoločnosťou Bausch Health

Sála Bellevue II.

14:40 – 15:40 PRAKTICKÉ ASPEKTY MANAŽMENTU JEDINCOV ŽIJÚCICH S OBEZITOU

Predsedenstvo: Peter Pekarovič, Ľubomíra Fábryová, Ľubomír Marko
Blok Slovenskej obezitologickej asociácie

- Kompetencie a možnosti všeobecného lekára v manažmente obezity
M. Mrázová (Bratislava)
- Prítomnosť a budúcnosť farmakoterapie obezity **Abstrakt č. 8**
Ľ. Fábryová (Bratislava)
- Praktické aspekty fungovania centra B/M chirurgie
Ľ. Marko (Banská Bystrica)
- Psychiatrické aspekty bariatrických /metabolických operácií **Abstrakt č. 9**
K. Ivanová (Trnava)



Chcete byť informovaní o odborných podujatiach?

Registrujte sa na **www.idl.sk**

**Podujatia pre lekárov, zdravotné sestry
a medicínsko-technických pracovníkov**



Kongresy | Konferencie | Semináre | Webináre | ON-LINE konferencie

ODBOBNÝ PROGRAM

15:50 – 16:50 POST-COVID 19 OČAMI KARDIOLOGA A INTERNISTU

Sála Bellevue II.

Predsedenstvo: Jana Bendová, Ján Lietava, Vera Kosmálová, Branislav Vohnout

- Post-COVID19 a srdce
J. Lietava (Bratislava)
- Post-COVID19 a hypertenzia
V. Kosmálová (Bratislava)
- Post-COVID19 a ateroskleróza
B. Vohnout (Bratislava)

17:00 – 18:00 AKO ZLEPŠIŤ KOMUNIKÁCIU LEKÁR-PACIENT. FENOTYPY PACIENTOV Z POHLADU LEKÁRA MANAŽUJÚCEHO KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA A POSTOJ PSYCHIATRA

Sála Bellevue II.

Predsedenstvo: M. Matusová, I. Šoóšová

Sympóziu podorené spoločnosťou SERVIER

- PANELOVÁ DISKUSIA
*Členovia panelu: I. Šoóšová (Bratislava), L. Izáková (Bratislava),
P. Letavay (Dolný Kubín), M. Matusová (Dunajská Streda)*

20:30 Diskusný večer SSVPL

Štvrtok 13. 10. 2022

13:30 – 14:30 AMBULANTNÝ SW, NCZI A SOCIÁLNA POISŤOVŇA. ČO ICH SPÁJA A ČO ROZDELUJE?

Sála Bellevue III.

Predsedenstvo: Soňa Ostrovská, Adriana Šimková

- Panelová diskusia
za prítomnosti zástupcov BSK, Soc. poisťovne a NCZI

14:40 – 15:40 PANELOVÁ DISKUSIA: ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Sála Bellevue III.

Predsedenstvo: Soňa Ostrovská, Adriana Šimková

- UNION
E. Majeková, P. Sloboda
- VŠZP
B. Havelková
- Dôvera
M. Kultán, M. Faktor

15:50 – 16:50 KRÁTKE INTERVENČIE, MOTIVAČNÝ ROZHOVOR A TERAPEUTICKÁ EDUKÁCIA PACIENTA V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

Sála Bellevue III.

Predsedenstvo: Jozef Čajka, Marianna Mrázová, Hana Vrabcová

- Krátke intervencie, motivačný rozhovor a Terapeutická edukácia pacientov s obezitou v primárnej zdravotníckej starostlivosti **Abstrakt č. 10**
H. Vrabcová (Bratislava), M. Mrázová (Bratislava), Y. Gondášová (Zvolen)

17:00 – 18:00 VARIA

Sála Bellevue III.

Predsedenstvo: Peter Pekarovič

- Osteoporóza – najnovšie zmeny v manažmente indikácie denzitometrického vyšetrenia u pacientov s rizikovými faktormi v ambulancii VPL
E. Ďurišová (Hlohovec)
Prednáška podorená spoločnosťou AMGEN
- SM systém – TERAPIA POHYBOM
M. Rafajdus (Trnava)
- Využívaním telemedicíny v primárnej péči v době pandémie COVID-19 perspektívou pacientů **Abstrakt č. 11**
K. Dobiašová, J. Kopsa Těšinová (Praha)
- Environmentálne znečistenie vybraných lokalít Slovenska **Abstrakt č. 12**
T. Kimáková (Košice)

Piatok 14. 10. 2022

ODBOBNÝ PROGRAM

Súčasťou každého bloku prednášok
je záverečná diskusia
nasledujúca po prednáškach

Sála Bellevue I.

8:00 – 9:00 NEFARMAKOLOGICKÝ PRÍSTUP V PREVENCI A LIEČBE CHRONICKÝCH NEPRENOSNÝCH OCHORENÍ

Predsedenstvo: Beáta Blahová, Jana Babjaková, Adela Penesová, Viktor Bielik

Blok SAVP

- Biologická hodnota a klinické využitie prirodzene sa vyskytujúcich probiotík
V. Bielik, I. Hric, J. Babjaková, L. Kubáňová, M. Tkáčiková, A. Penesová (Bratislava)
- Obezita a diabetes vo vzťahu k črevnému mikrobiómu **Abstrakt č. 13**
A. Penesová, L. Kubáňová, I. Hric, S. Ugrayová, J. Babjaková, A. Havranová, Ž. Rádiková, V. Bielik (Bratislava)
- Existuje prepojenie medzi výživou, zdravím a udržateľnosťou? **Abstrakt č. 14**
J. Babjaková, A. Penesová, V. Bielik, L. Argalášová (Bratislava)

9:00 – 9:10 Prestávka

9:10 – 10:10 B12 DEFICIENCIA V PRAXI – ČO SME MOŽNO NEVEDELI?

Predsedenstvo: Peter Makara

Blok podporený spoločnosťou Worwag

- Vitamín B12, význam a prejavy jeho nedostatku **Abstrakt č. 15**
I. Lazúrová (Košice)
- Kedy, jak a proč léčit deficit B12
R. Češka (Praha)

10:10 – 10:20 Prestávka

10:20 – 11:20 EKG DIAGNOSTIKA V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA Interaktívny workshop

Predsedenstvo: Slavomíra Filipová, Ľudmila Resutíková

- Supraventrikulárne a funkčné arytmie
S. Filipová (Bratislava)
- Ventrikulárne arytmie
S. Filipová (Bratislava)
- Poruchy atrioventrikulárneho vedenia
S. Filipová (Bratislava)
- Poruchy vnútrokomorového vedenia
Workshop s interaktívnym hlasovaním podľa otázok + voľná diskusia
S. Filipová (Bratislava)
- Zmeny v EKG obraze, ktoré zmenia život – kazuistika
Ľ. Resutíková (Želovce)

11:20 – 11:30 Prestávka

11:30 – 12:30 MALÝ KROK PRE CIEVY, VEĽKÝ KROK PRE KVALITU ŽIVOTA

Predsedenstvo: Katarína Kováčová, K. Kmeťková, J. Števlík, M. Moščovič

Blok podporený spoločnosťou KRKA

- Miesto mikronizovaného diosmínu v liečba chronického venózneho ochorenia
K. Kmeťková (Banská Bystrica)
- Blokátory RAS- iný príbeh, ale rovnaký cieľ. Je možné očakávať pokrok bez zmeny?
J. Števlík (Bratislava)
- Skrotenie zlej variability. Keď kontrola TK nestačí pre úplnú KV ochranu
M. Moščovič (Košice)

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30 PANELOVÁ DISKUSIA: AK TO NEVIEME ODMERAŤ, NEMÔŽEME TO ZMENIŤ! DÔLEŽITOSŤ PREVENIE V PANDEMICKOM OBDOBÍ

Moderátor: Adriana Šimková

Blok podporený spoločnosťou VIATRIS

- SCORE2 – očami špecialistov.
 - Nutraceutiká a ich využitie v každodennej praxi.
 - Pozeráme správne na lipidové spektrum?
 - Oplyvňuje počet úderov srdca a hypertenzia dĺžku života?
- Diskutujúci: I. Majerčák (Košice), B. Vohnout, (Bratislava), I. Šoóšová (Bratislava)*

14:30 – 14:40 Prestávka

14:40 – 15:40 MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA Charta 70/2023 – výsledky 2019-2022

Predsedenstvo: Adriana Šimková, Slavomíra Filipová, Anna Vachulová

Blok Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

- Čo sme spoločne dokázali zmeniť za 3 roky aktivity Charty?
S. Filipová (Bratislava)
- Domáce monitorovanie tlaku krvi – výsledky z roku 2022
A. Šimková (Pezinok)
- Hypertenzia a pridružené KV rizikové faktory (DMTK 2022)
– implikácie do praxe
A. Vachulová (Bratislava)

15:40 – 15:50 Prestávka

Sála Bellevue I.

Sála Bellevue I.

Sála Bellevue I.

ODBORNÝ PROGRAM

Piatok 14. 10. 2022

15:50 – 16:50 NOVÁ ÉRA V LIEČBE OBEZITY V NAŠEJ PRAXI

Predsedenstvo: Peter Makara

Sympóziu podoporené spoločnosťou Novo Nordisk

- Liraglutid v liečbe obezity **Abstrakt č. 16**
M. Lörincová (Banská Bystrica)
- Skúsenosti s liečbou obezity liraglutidom v praxi všeobecného lekára – kazuistika
S. Bachledová (Košice)
- Skúsenosti s liečbou obezity liraglutidom v praxi internistu – kazuistika
S. Šuch (Martin)

16:50 – 17:00 Prestávka

17:00 – 18:00 OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽLÁZY

Predsedenstvo: Adrina Šimková

Blok podoporený spoločnosťou MERCK

- Osteoporóza: štandardný diagnostický a terapeutický postup
J. Payer, Z. Killinger, P. Jackuliak, M. Kužma, S. Dubecká (Bratislava)
- Využitie tyroxínu v liečbe endokrinných ochorení
J. Payer, M. Kužma, P. Jackuliak (Bratislava)
- Aké sú možnosti VL v starostlivosti o pacientov s hypotyreózou? Limity a výzvy **Abstrakt č. 17**
A. Šimková (Pezinok)

20:30 Diskusný večer SSVPL

Sála Bellevue I.

Sála Bellevue I.

8:00 – 9:00

BLOK TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA

Predsedenstvo: Peter Lipovský, Katarína Bergendiová, Tibor Hlavatý

- Ako športovať po prekonaní Covid infekcie?
K. Bergendiová (Bratislava)
- Telovýchovné lekárske vyšetrenie v praxi
K. Dedinská (Bratislava)
- Pohyb ako liek – preskripcia pohybovej aktivity
T. Hlavatý (Bratislava)

Sála Bellevue II.

9:10 – 10:10

BLOK PNEUMÓLOGIE A FTIZEOLÓGIE

Predsedenstvo: Beáta Blahová, Ivan Solovič

- Hypoventilačný syndróm pri obezite
J. Kmiťová (Vyšné Hágy)
- Absces pľúc
P. Hrušková (Vyšné Hágy)
- Tuberkulóza na pozadí vojnového konfliktu na Ukrajine **Abstrakt č. 18**
I. Solovič (Vyšné Hágy)

Sála Bellevue II.

10:20 – 11:20

PRIMÁRNA PREVENCIA ZHUBNÝCH NÁDOROV PROBIOTIKÁ A ZHUBNÉ NÁDORY

Predsedenstvo: Ľubomír Molčan, Peter Minárik, Adela Penesová, Daniela Mináriková

- Úloha črevnej mikrobioty a probiotík pri prevencii zhubných nádorov
P. Minárik (Bratislava) **Abstrakt č. 19**
- Starostlivosť o črevnú mikrobiotu: tipy na udržiavanie a posilňovanie zdravého intestinálneho mikrobiómu **Abstrakt č. 20**
A. Penesová (Bratislava)
- Ako si vybrať kvalitný probiotický prípravok **Abstrakt č. 21**
D. Mináriková (Bratislava)

Sála Bellevue II.

ODBORNÝ PROGRAM

11:30 – 12:30 ONKOLOGICKÉ SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY

Predsedenstvo: Jana Bendová, Jana Trautenberg Ricová, Alena Kallayová, Andrej Orságh, Beata Blahová

- Onkologické skrínigové programy na Slovensku – aktualizácia súčasného stavu **Abstrakt č. 22**
J. Trautenberg Ricová (Bratislava)
- Skrínig kolorektálneho karcinómu – zaoštréné na rizikóvú populáciu **Abstrakt č. 23**
A. Orságh (Bratislava)
- Skrínig rakoviny prsníka: viaceré aspekty jeho fungovania **Abstrakt č. 24**
A. Kallayová (Bratislava)
- Efekt skrínigu kolorektálneho karcinómu v ambulancii všeobecného lekára **Abstrakt č. 25**
B. Blahová (Krompachy)

13:30 – 14:30 DERMATOLÓGIA

Predsedenstvo: Peter Lipovský, Hana Zelenková

- Terapija ciclosporinom A v dermatológii – prehľad v terapii psoriázy, atopickej dermatitidy, alergickej vaskulitidy a iných dermatóz **Abstrakt č. 26**
H. Zelenková (Svidník)
- Kompresívna terapia **Abstrakt č. 27**
L. Gibejová (Svidník)
- Sklerodermia a jej dopad na kvalitu života pacienta **Abstrakt č. 28**
M. Sakalíková (Svidník)
- Najnovšie liečebné trendy v liečbe ulcus cruris **Abstrakt č. 29**
V. Hromohová (Svidník)
- Pulverizácia a jej využitie v dermatológii **Abstrakt č. 30**
L. Zeherová (Svidník)
- Parazitózy a parazitofóbie v dermatológii **Abstrakt č. 31**
H. Zelenková (Svidník)

15:50 – 16:50 PREČO JE ADHERENCIA K FARMAKOTERAPII DÔLEŽITÁ?

Predsedenstvo: Adriana Šimková

- Traja pre jedného. Pacient s hypertenziou v obklopení lekára, poisťovne a nemedicínskeho edukátora. Spoločne na ceste za lepšou adherenciou **Abstrakt č. 29**
R. Mužik (Bratislava), A. Šimková (Pezinok), E. Košútová (Bratislava)
Prednáška podporená spoločnosťou Dôvera
- Adherencia k liečbe z pohľadu dát, porovnanie preskripcie fixnej a voľnej kombinácie antihypertenzív **Abstrakt č. 30**
R. Mužik (Bratislava)
Prednáška podporená spoločnosťou Dôvera
- Podpora pacienta v adherencii k liečbe hypertenzie a nemedicínske poradenstvo, ktoré robí zdravotná poisťovňa **Abstrakt č. 31**
edukátorka z telefonického poradenstva
Prednáška podporená spoločnosťou Dôvera
- Liečba artériovej hypertenzie u starších pacientov **Abstrakt č. 32**
K. Beňová, J. Kasenčáková (Prešov)

17:00 – 18:00 ANGIOLOGICKÝ BLOK

Predsedenstvo: Peter Makara, Katarína Dostálová, Juraj Maďarič, Miroslav Širila

- Renálna sympatiková denervácia u pacienta s artériovou hypertenziou v praxi **Abstrakt č. 31**
J. Maďarič (Bratislava), L. Flák (Bratislava)
- Angiologicke vyšetrenie – urgentná a elektívna indikácia **Abstrakt č. 32**
M. Širila (Trenčín)
- Určenie etiológie venózneho tromboembolizmu – kľúč k efektívnej liečbe **Abstrakt č. 33**
K. Dostálová, M. Bartušová, E. Horváthová, Š. Moricová (Bratislava)

Diskusný večer SSVPL

ODBOBNÝ PROGRAM

Piatok 14. 10. 2022

Sála Bellevue III.

9:10 – 10:10 TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO PRE NEŠPORTUJÚCEHO PACIENTA

Predsedníctvo: Jozef Čajka

- Chyby a mýty o kondíci, rekondíci a dekoníci ve stáří
J. Radvanský (Praha)
- Športová rehabilitácia nešportovcov
M. Vahovič (Prešov)
- Diagnostika pohybového aparátu v kontextu fasciálnych tkní
M. Peroutka (Praha)
- Kinematická a posturálna péče o běžce
O. Růžek (Praha)

Sála Bellevue III.

10:20 – 11:20 KAM ĎALEJ S OČKOVANÍM PROTI COVID-19

Predsedníctvo: Peter Lipovský

Blok podporený spoločnosťou Medison Pharma

- mRNA technológia v prevencii COVID-19
J. Sokolová (Trnava)
- Praktické aspekty očkovania proti COVID-19 v ambulancii VLD
P. Lipovský (Miloslavov)

Sála Bellevue III.

11:30 – 12:30 OČKOVANIE V KONTEXTE OCHRANY ZDRAVIA – MEDICÍNSKE A PRÁVNE ASPEKTY

Predsedníctvo: Michaela Macháčová

- Očkovať sa oplatí **Abstrakt č. 34**
A. Bražinová (Bratislava)
- Letom preskripčným svetom **Abstrakt č. 35**
P. Kováč (Bratislava)
- Povinné očkovanie v medzinárodnom kontexte
L. Garayová (Bratislava)
- Bioetické otázky k téme povinného očkovania **Abstrakt č. 36**
A. Erdášová (Bratislava)

Sála Bellevue III.

13:30 – 14:30 VARIA

Predsedníctvo: Peter Pekarovič

- Možnosti využitia nootropickej liečby v ambulancii všeobecného lekára z pohľadu neurológa
G. Hajaš (Nitra)
- Prednáška podporená spoločnosťou Gedeon Richter Slovakia

- Aneurizma brušnej aorty: skrining, liečba a následný manažment
L. Vincze (Bratislava) **Abstrakt č. 37**
 - N-acetylcysteín – 30 rokov skúseností a nových poznatkov na Slovensku
M. Miškovská (Poprad)
- Prednáška podporená spoločnosťou IBSA

Sála Bellevue III.

14:40 – 15:40 VARIA

Predsedníctvo: Peter Pekarovič

- Cefprozil v liečbe tonzylitidy a niektorých respiračných ochorení
K. Kralinský (Banská Bystrica) **Abstrakt č. 38**
 - Erdosteín a jeho využitie v liečbe akútnych respiračných infekcií
D. Lauková (Nitra)
 - Komunikácia s pacientom v prediálze. Aké informácie pacientom podávame? **Abstrakt č. 39**
E. Kováčová (Trenčín)
- Prednáška podporená spoločnosťou Bausch Health
- Prednáška podporená spoločnosťou Angelini Pharma

Sála Bellevue III.

15:50 – 16:50 FIBRILÁCIA PREDSENIÍ A NOVÉ TRENDY V SRDCOVOM ZLYHÁVANÍ

Predsedníctvo: Michaela Macháčová

- Srdcové zlyhávanie **Abstrakt č. 40**
J. Murín (Bratislava)
- Fibrilácia predsiení a srdcové zlyhávanie – kazuistika
M. Macháčová (Bratislava)
- Synkopa, diagnostický prínos EKG **Abstrakt č. 41**
Z. Mačudová (Poprad), A. Fathi (Svit)

Sála Bellevue III.

17:00 – 18:00 TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

Predsedníctvo: Stanislava Bachledová

- Narušená mikrobiota z pohľadu TČM
J. Lucký (Praha), Dr. Balková (Žilina)
- Dietetika z pohľadu tradičnej čínskej medicíny a jej uplatnenie v súčasnej dobe **Abstrakt č. 42**
Z. Semanová (Košice)

Sobota 15. 10. 2022

ODBOBNÝ PROGRAM

Súčastou každého bloku prednášok
je záverečná diskusia
nasledujúca po prednáškach

Sála Bellevue I.

8:30 – 9:30 MANAŽMENT PACIENTA S OCHORENÍM KOLENNÉHO KÍBU

Predsedníctvo: Jana Bendová, Peter Klein, Matej Handžák

Ortopedický blok

- Manažment pacienta s bolesťou kolena
P. Klein (Prešov)
- Praktická ukážka vyšetrenia kolenného kĺbu
M. Handžák (Poprad)

9:30 – 9:40 Prestávka

Sála Bellevue I.

9:40 – 10:40 AKTUÁLNE POKROKY V PREVENCII A LIEČBE INFEKČNÝCH OCHORENÍ

Predsedníctvo: Soňa Ostrovská, Ingrid Urbančíková

Blok podporený spoločnosťou Pfizer

- Význam očkovania proti Covidu-19 v súčasnosti **Abstrakt č. 43**
Z. Krištúfková (Bratislava)
- Prevencia a liečba respiračných infekcií
I. Urbančíková (Košice)
- Kliešte a kliešťová encefalitída na Slovensku pod vplyvom zmien
B. Peťko (Košice)

10:40 – 10:50 Prestávka

Sála Bellevue I.

10:50 – 11:50 BLOK SLOVENSKEJ EPIDEMIOLOGICKEJ A VAKCINOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (SEVS)

Predsedníctvo: Soňa Ostrovská, Henrieta Hudečková,
Zuzana Krištúfková, Dagmar Gavačová

- Nové a staronové epidemiologické riziká pre Slovensko
H. Hudečková (Bratislava)
- Opičie kiahne – nová hrozba?
Z. Krištúfková (Bratislava)
- Exotické salmonelózy u nás doma – nielen korytnačky nie sú hračky...
D. Gavačová (Bratislava)

11:50 – 12:00 Prestávka

12:00 – 13:00 MODEROVANÁ DISKUSIA NA PÓDIU „ČAS NA OTÁZKY“ (QUESTION TIME) – ČLENSKÁ SCHÔDZA

Predsedníctvo: Peter Makara, Peter Lipovský, Jana Bendová,
Katarína Kováčová, Michaela Macháčová,
Soňa Ostrovská, Adriana Šimková

ČLENSKÁ SCHÔDZA SSVPL



sa koná

v sobotu 15.10.2022

od 12:00 do 13:00

v Hoteli Bellevue – sála Bellevue I.

Sobota 15. 10. 2022

8:30 – 9:30 BLOK Kliniky všeobecného lekárstva UPJS LF a Nemocnice AGEL Košice Šaca a.s.

Sála Bellevue II.

Predsedenstvo: Katarína Kováčová, Peter Kalanin, Jana Annová, Ivana Nickel Bakalárová

- Profesionálny syndróm karpálneho tunela v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
P. Kalanin (Košice)
- Čo sa môže skrývať za bolesťou hrdla? – kazuistika
J. Annová (Košice)
- Akútna perikarditída v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
I. Nickel Bakalárová (Košice)
- Benefity silového tréningu u seniorov
M. Fečík (Košice)

9:40 – 10:40 PREVENTÍVNA KARDIOLOGIA. NOVÉ MOŽNOSTI V MANAŽMENTE PACIENTOV SO ZVÝŠENÝM KV RIZIKOM

Sála Bellevue II.

Predsedenstvo: Štefan Farský, Adriana Šimková, Zuzana Gavalierová

- Systematický monitoring KV rizika (preventívne postupy)
Š. Farský (Žilina)
- Starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou prostredníctvom telekonzultácií (ŠDTP)
A. Šimková (Pezinok)
- Úloha sestry v komplexnom manažmente kardiovaskulárneho rizika-SCORE2 (z praxe)
Z. Gavalierová (Svit)

Perorálna liečba nedostatku vitamínu B12 JEDNODUCHO, EFEKTÍVNE



NOVÝ
RX LIEK
tablety

Liek Vitamín B12 gamma® obsahuje
1 000 mikrogramov kyanokobalamínu v jednej tablete

Je vysoko účinný a ľahko sa užíva



Vysoká dávka:
1 000 µg v 1 tbl.



Jednoduché užitie:
tablety



Iba
1x denne

Skrátená informácia o lieku:

Lieková forma: Obalená tableta. **Terapeutické indikácie:** Liečba nedostatku vitamínu B12 u pacientov s diagnostikovaným nedostatkom vitamínu B12, ktorí sú prísnymi vegetariánmi, ktorí majú malabsorpciu vitamínu B12, s diagnostikovanou pernicióznou anémiou, s diagnostikovanou atrofičnou gastritídou, alebo ktorí majú celiakiu. Podporná, doplnková liečba pri dlhodobom užívaní aminosalicylátov, inhibítorov protónovej pumpy a metformínu. Liek je vhodný pre deti vo veku 7 rokov a staršie, dospievajúcich a dospelých. **Dávkovanie:** Odporúčaná denná dávka je 1 000 mikrogramov kyanokobalamínu (jedna tableta lieku Vitamín B12 gamma). Cieľom diagnostikou a kontrolou liečby sa má stanoviť pre pacienta optimálne dávkovanie kyanokobalamínu. **Kontraindikácie:** Známa precitlivosť na kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Nesmie sa podávať pacientom, u ktorých je potrebné vykonať detoxikáciu kyanidov (napr. pacienti s tabakovou amblyopiou alebo retinulárnou neuritídou pri pernicióznnej anémii). V týchto prípadoch sa majú podať iné deriváty kobalamínu. Pacientom s nedostatkom vitamínu B12, ktorým hrozí riziko Leberovej atrofie optického nervu, nesmie sa podávať kyanokobalamín na liečbu nedostatku vitamínu B12. **Nežiaduce účinky:** Ojedinelé nežiaduce reakcie z vedeckej literatúry boli hlásené pri perorálnej podávanej suplementácii kyanokobalamínu v dávke najviac 1 000 mikrogramov denne. Nežiaduce reakcie boli zaznamenané prevažne pri parenterálnom podaní. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Nie sú známe škodlivé účinky kyanokobalamínu na ľudskú fertilitu. Po suplementácii vitamínu B12 bola zaznamenaná lepšia kvalita spermií. Vitamín B12 gamma sa môže používať v období dojčenia. Dôkazy naznačujú, že suplementácia vitamínom B12 počas tehotenstva a dojčenia predstavuje minimálne riziko pre matku a dieťa. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** Vitamín B12 gamma nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. **Druh obalu a obsah balenia:** PVC/PVDC/ALU blistrové balenia po 50 a 100 obalených tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. **REGISTRACNÉ ČÍSLO:** 86/0195/21-S. **DÁTUM REVÍZIE TEXTU:** 12/2021. **SPÔSOB VÝDAJA A ÚHRADY:** Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. **POZNÁMKA:** Skôr ako liek predpíšete, prečítajte si starostlivo úplnú informáciu o lieku (SPC).

Wörwag Pharma Slovensko s.r.o., Iľanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, tel. 02/4488 9920, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk

ODBORNÉ VZDELÁVANIE PRE SESTRY

Sobota 15. 10. 2022

Grand Hotel Starý Smokovec

8:00 – 9:00 I. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedenstvo: Zuzana Gavalierová, Antónia Mlynarčíková

- **Liečba ulcus cruris v klinickej štúdii v našom zariadení**
L. Gibejová (Svidník)
- **Sklerodermia a jej dopad na kvalitu života pacienta**
M. Sakalíková (Svidník)
- **Najnovšie liečebné trendy v liečbe ulcus cruris**
V. Hromohová (Svidník)
- **Pulverizácia a jej využitie v dermatológii**
L. Zeherová L. (Svidník)

Grand Hotel Starý Smokovec

9:00 – 9:10 OTVORENIE KONFERENCIE

Grand Hotel Starý Smokovec

9:10 – 10:40 II. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK VŠZASP SV. ALŽBETY BRATISLAVA

Predsedenstvo: Mária Popovičová, Daniela Barkasi

- **Signifikančné predikcie fluktuácie sestier** **Abstrakt č. 44**
M. Popovičová
- **Postoje sestier k ochrane vlastného zdravia** **Abstrakt č. 45**
V. Ivanková, M. Belovičová
- **Sociálny pracovník – súčasť tímu v zdravotníckom zariadení** **Abstrakt č. 46**
D. Barkasi
- **Vplyv sociálnej rehabilitácie na sebestačnosť u osôb s ťažkým zdravotným postihnutím** **Abstrakt č. 47**
K. Šúpolová, D. Barkasi
- **Medikačné pochybenia a lieky rizikové k zámene** **Abstrakt č. 48**
T. Hudáková, M. Popovičová
- **Inkontinencia moču a kvalita života**
J. Babečka

10:40 – 11:00 Prestávka

Grand Hotel Starý Smokovec

11:00 – 12:00 III. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedenstvo: Petra Sekulová, Renáta Suranovská

- **Diabetická noha a jej negatívny vplyv na kvalitu života** **Abstrakt č. 49**
K. Dostálová, D. Hajnalová, D. Bartušová, Š. Moricová (Bratislava)
- **Kompresívna liečba – kedy áno, kedy nie** **Abstrakt č. 50**
K. Dostálová, D. Hajnalová, D. Horváthová, Š. Moricová (Bratislava)
- **Komunikácia s pacientom v prediálýze. Aké informácie pacientom podávame?**
E. Kováčová (Trenčín)
- **Téma vyhradená pre Kontrolný výbor SK SaPA**
Kontrolný výbor SKSaPA
- **Téma vyhradená**
I. Drahoňová, SK SaPA

Grand Hotel Starý Smokovec

12:00 – 14:00 IV. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedenstvo: Petra Sekulová, Zuzana Gavalierová

- **Viem čo mi je, mám zaprášené pľúca (kazuistika)**
A. Fathi (Svit)
- **Základy EKG pre sestry**
Z. Mačudová (Poprad)
- **Motivácia pacienta s nadhmotnosťou/ obezitou k želanej zmene správania z pohľadu ortopéda**
S. Fathiová, A. Fathi (Poprad)
- **Základné doplnky a výber palíc pre nordic walking (NW)**
L. Novotný (Topoľníky)
- **Očkovanie pred cestou do zahraničia**
P. Sekulová (Spišská Nová Ves)
- **Starostlivosť o dospelého pacienta s dyslipoproteinémiou, edukácia sestrou**
Z. Gavalierová (Svit), A. Fathi (Poprad)

WORKSHOPY

Štvrtok 13. 10. 2022

13:30 – 14:30 AROMATERAPIA A JEJ VPLYV NA CELKOVÉ TELO A PSYCHIKU

Salónik Kristal

Mechanizmus účinku pôsobenia aromaterapie.
Zloženie esenciálnych olejov, ich užívanie.
Vplyv esenciálnych olejov na psychiku.
Emočné traumy a strachy, pocity viny, hanby a nižšie úrovne vedomia.
Ako harmonizovať emočné stavy?

14:40 – 15:40 STABILIZÁTOR CIRKULÁCIE ENERGIE KRVÍ

Salónik Kristal

Predstavenie prístroja na stabilizáciu cirkulácie energie krvi (možnosti využitia v ambulanciách, zdravotníckych štúdiách, medicínskych centrách ako aj v domácom podmienkach) a produktov tradičnej čínskej medicíny s tým súvisiacich.

15:50 – 16:50 DETOXIKÁCIA A VÝŽIVA ORGANIZMU PRÍRODNÝMI ŠŤAVAMI, PRÍRODNÁ LIEČBA BORELIÓZY

Salónik Kristal

Meranie jednotlivých systémov v tele EWS analyzátorom

17:00 – 18:00 PSYCHOSOMATICKÝ PRÍSTUP V MEDICÍNE

Salónik Kristal

5 aspektov, ktoré sa podieľajú v procese ochorenia:
Vplyv jednotlivých aspektov v procese psychosomatického prístupu.
Vzájomné prepojenie mentálne – emočného aspektu a ich dopad na zdravie
Vzťahy a ich vplyv na prognózu pacienta
Vplyv stravy a pohybu v psychosomatickom procese
Hľadanie hlbšieho zmyslu života.

OCHRANA PRED PNEUMOKOKOVÝMI OCHORENÍAMI ZAČÍNA VO VAŠEJ AMBULANCIÍ.

COVID-19 nie je jedinou hrozbou, pokiaľ ide o infekčné respiračné ochorenia.
Chráňte Vašich pacientov aj pred pneumokokovými ochoreniami.

Pri očkovaní proti chrípke nezabudnite očkovať aj proti pneumokokovým infekciám.
Najviac ohrození sú starší pacienti a chronicky chorí.^{1,2}

Prevenar 13 je plne hrazený pre ľudí nad 59 rokov a rizikové skupiny.³

Referencie: 1. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku Prevenar 13. 2. Supporting Active Ageing Through Immunisation Partnership 2013, Adult vaccination: a key component of healthy aging. 3. Indikačné obmedzenie Prevenar 13.

Tak ako každá očkovacia látka, ani Prevenar 13 nemusí 100 % chrániť všetky očkované osoby pred invazívnym ochorením a pneumóniami spôsobenými kmeňmi *Streptococcus pneumoniae*, ktoré vakcína obsahuje a nechráni pred typmi neobsiahnutými vo vakcíne ani inými mikroorganizmami. Táto skrátená informácia o lieku je určená osobám oprávneným predpisovať alebo vydávať lieky. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU – Prevenar 13 injekčná suspenzia – Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentná, adsorbovaná). Jedna 0,5 ml dávka obsahuje: pneumokokový polysacharid sérotyp 1* (2,2 µg), 3* (2,2 µg), 4* (2,2 µg), 6A* (2,2 µg), 6B* (4,4 µg), 7F* (2,2 µg), 9V* (2,2 µg), 14* (2,2 µg), 18C* (2,2 µg), 19A* (2,2 µg), 19F* (2,2 µg), 23F* (2,2 µg). *Konjugovaný s CRM197 nosičovým proteínom, adsorbovaný na fosforečnan hliníty. **Indikácie:** Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení, pneumónie a akútneho otitis media spôsobených *Streptococcus pneumoniae* u dojčiat, detí a dospelých vo veku od 6 týždňov do 17 rokov. Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení a pneumónie spôsobených *Streptococcus pneumoniae* u dospelých vo veku od 18 rokov a starších. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Vakcinačné schémy pre Prevenar 13 majú byť založené na oficiálnych odporúčaní. **Dojčatá a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov:** Odporúča sa, aby deti, ktoré dostanú prvú dávku Prevenaru 13, dokončili celý očkovací program s Prevenarom 13. **Dojčatá vo veku 6 týždňov – 6 mesiacov:** Trojdávková základná schéma: Odporúčaná imunizačná schéma obsahuje štyri dávky, každú po 0,5 ml. Základné dávkovanie pre dojčatá obsahuje tri dávky, prvá dávka sa obyčajne podáva v 2. mesiaci veku s intervalom minimálne 1 mesiac medzi dávkami. Prvá dávka môže byť podaná už v 6. týždni veku. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. **Dvoj dávková základná schéma:** V prípade, že sa Prevenar 13 podáva ako súčasť bežného očkovacieho programu dojčiat, schéma môže pozostávať z troch dávok, každá po 0,5 ml. Prvá dávka sa má podať od veku 2 mesiacov, druhá o 2 mesiace neskôr. Tretia (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. **U predčasne narodených detí** odporúčaná imunizačná schéma pozostáva zo štyroch dávok po 0,5 ml. **Neočkované dojčatá a deti vo veku >= 7 mesiacov:** Dojčatá vo veku 7 – 11 mesiacov: Dve dávky, každá po 0,5 ml, s intervalom najmenej 1 mesiac medzi jednotlivými dávkami. Tretia dávka je odporúčaná v druhom roku života. **Deti vo veku 12 – 23 mesiacov:** Dve dávky, každá po 0,5 ml s intervalom najmenej 2 mesiace medzi jednotlivými dávkami. **Pediatrická populácia vo veku 2 – 17 rokov:** Jedna 0,5 ml dávka. **Dospelí vo veku od 18 rokov a starší:** Jedna jednorazová dávka. Potreba preočkovania ďalšou dávkou Prevenaru 13 nebola stanovená. Ak sa považuje za vhodné podanie 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, bez ohľadu na predchádzajúci stav očkovania proti pneumokokom, ako prvú sa má podať Prevenar 13. Vakcína sa má podať intramuskulárnou injekciou. U dojčiat je preferovaným miestom anterolaterálna oblasť stehna (m. vastus lateralis) alebo deltový sval hornej končatiny u detí a dospelých. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na diškrétne toxoidy. Ako u všetkých vakcín, podanie Prevenaru 13 sa má u osôb trpiacich akútnym ťažkým horúčkovitým ochorením odložiť na neskôr. Avšak výskyt malej infekcie, akou je náchka, nemá byť dôvodom na odklad očkovania. **Špeciálne upozornenia:** Prevenar 13 sa nesmie podávať intravaskulárne. Táto vakcína sa nemá podávať ako intramuskulárna injekcia osobám s trombocytopéniou alebo inou poruchou koagulácie krvi, u ktorých je kontraindikované intramuskulárne injekčné podanie, ale môže sa podať subkutánne, ak potenciálny prospech jednoznačne prevyšuje riziká. Prevenar 13 chráni len proti sérotypom *Streptococcus pneumoniae*, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne a nechráni proti ostatným mikroorganizmom vyvolávajúcim invazívne ochorenia, pneumóniu alebo otitis media. Tak ako u každej vakcíny, Prevenar 13 nemusí chrániť pred pneumokokovými ochoreniami všetky osoby, ktorým bol podaný. **Špeciálne populácie:** Osoby so základnými ochoreniami s náchylnosťou na invazívne pneumokokové ochorenia vrátane osôb predtým očkovaných jednou alebo viacerými dávkami 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, môžu dostať minimálne jednu dávku vakcíny Prevenar 13. U osôb s transplantáciou krovotvorných kmeňových buniek obsahuje odporúčaná imunizačná schéma štyri dávky Prevenaru 13, každú po 0,5 ml. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča 6 mesiacov po tretej dávke. **Nežiaduce účinky:** Medzi najčastejšie udávané nežiaduce účinkami u detí vo veku 6 týždňov až 5 rokov bola reakcia v mieste podania, horúčka, podráždenosť, znížená chuť do jedla a ospalosť a/alebo nespavosť, u pediatrickej populácie vo veku 6 až 17 rokov bola znížená chuť do jedla, podráždenosť, erytém v mieste očkovania; zdureníe/opuch alebo bolesť/zvýšená citlivosť; ospalosť; nekváľitný spánok; zvýšená citlivosť v mieste očkovania (vrátane zhoršenia pohyblivosti) a u dospelých znížená chuť do jedla, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, výrážka, zimnica, únavu, erytém v mieste vpichu, zatrdnutie/opuch a bolesť/citlivosť v mieste vpichu, obmedzenie pohybu v ramene, artalgia, myalgia. **Interakcie:** Dojčatá a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov: Prevenar 13 môže byť podaný súčasne s ktorýmkoľvek z nasledujúcich očkovacích antigénov podávaných buď vo forme monovalentnej alebo kombinovanej vakcíny: záškrt, tetanus, acelulárna alebo celulárna vakcína proti čiernemu kašľu, *Haemophilus influenzae* typ b, inaktivovaná detská obrna, hepatitída B, meningokoková sérokapšina C, ospky, mumps, ružienka, ovčie kiahne a rotavírusová vakcína. Prevenar 13 možno tiež podávať súčasne s konjugovanou očkovacou látkou obsahujúcou tetanový toxoid a meningokokové polysacharidové sérokapšiny A, C, W a Y deťom vo veku 12 až 23 mesiacov, ktoré už boli adekvátne imunizované Prevenarom 13. **Dospelí vo veku 50 rokov a starší:** Prevenar 13 sa môže podávať súčasne so sezónnou trivalentnou (TIV) a kvadrivalentnou (QIV) inaktivovanou vakcínou proti chrípke (TIV). Odlišné injekčné vakcíny sa majú vždy podať na rôzne miesta. **Predávkovanie:** Nie je pravdepodobné, nakoľko je k dispozícii v naplnených injekčných striekačkách. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Nie sú dostupné údaje o používaní Prevenaru 13 u gravidných žien. Nie je známe, či sa Prevenar 13 vylučuje do materského mlieka. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje:** Prevenar 13 nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. **Uchovávanie:** Uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávať v mrazničke. Prevenar 13 je stabilný štyri dni pri teplote do 25 °C. Na konci teploty doba sa musí Prevenar 13 použiť alebo zlikvidovať. Tieto údaje sú určené ako pomôcka pre zdravotníckych pracovníkov v prípade dočasných teplotných zmien. Informácia je určená pre odbornú verejnosť. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením aktuálneho súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). **Dátum aktualizácie skrátené informácie o lieku: december 2020. Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko. **Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii:** Pfizer Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 5500. **Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 25. novembra 2020.**

Piatok 14. 10. 2022

9:10 – 10:10 PSYCHOSOMATICKÝ PRÍSTUP V MEDICÍNE

Salónik Kristal

5 aspektov, ktoré sa podieľajú v procese ochorenia:

- Vplyv jednotlivých aspektov v procese psychosomatického prístupu.
- Vzájomné prepojenie mentálneho – emočného aspektu a ich dopad na zdravie
- Vzťahy a ich vplyv na prognózu pacienta
- Vplyv stravy a pohybu v psychosomatickom procese
- Hľadanie hlbšieho zmyslu života.

10:20 – 11:20 MIKROIMUNOTERAPIA V AMBULATNEJ PRAXI

Salónik Kristal

J. Wendlová

Cieľ mikroimunoterapie:

Poskytnúť lekárom prvého kontaktu efektívnu podpornú liečbu imunitného systému najmä v čase opakujúcich sa pandémie s vírusovými infekciami, ale aj pre pacientov s alergiami, autoimunitnými ochoreniami, malígnymi ochoreniami, neurodegeneratívnymi ochoreniami.

Vzdelávacie inštitúcie: Francúzsky inštitút pre mikroimunoterapiu, Paríž, Francúzsko
Lekárska spoločnosť pre mikroimunoterapiu, Viedeň, Rakúsko

Cieľ úvodného seminára: Oboznámiť slovenských lekárov s mikroimunoterapiou a možnosťami certifikovaného vzdelávania sa v tomto odbore

11:30 – 12:30 SYNERGIA PSYCHOSOMATICKÉHO A FYZIOTERAPEUTICKÉHO PRÍSTUPU PRI (VAS), VERTEBROGÉNNOM ALGICKOM SYNDRÓME A VERTEBRO-VISCERÁLNE VZŤAHY

Salónik Kristal

Vplyv a kombinácia psychosomatických a fyzioterapeutických postupov, môže v mnohých prípadoch pomôcť s rýchlejšou rekonvalescenciou pacienta s VAS. Dokáže uvoľniť blokády. Kausálnym riešením môže byť práve táto kombinácia, pretože dochádza k zníženiu rizika interakcií, ktoré by mohli nastať. psychosomatický podnet sa môže prejavovať podobnými príznakmi ako pri kardiovaskulárnych alebo gastrointestinálnych ochoreniach. V niektorých prípadoch je riešením situácie, uvoľnenie bránice a emočného napätia.

12:30 – 13:30 Obed

STANDARD F200

SD BIOSENSOR

moderný multiparametrový
imunofluorescenčný POCT analyzátor



- CRP • PCT (prokalcitonín) • D-dimér • FOB kvantita • HbA1c • U-albumín
- TnI • NT-proBNP • CK-MB • hs-CRP • β-hCG • LH • TSH-II
- Strep A • Influenza A/B • Strep. pneumoniae Ag • Legionella Ag • RSV Ag • B. burgdorferi IgG/IgM
- Rotavirus Ag • Norovirus Ag • H. pylori Ag • C. difficile GDH+Tox A/B

COVID-19: protilátky IgM / IgG • vírusový antigén (výter z nosohltanu a z nosa)

Celercare M5

biochemický analyzátor

MNCHIP



- plnoautomatický systém
- rýchlosť stanovenia: 13 minút/panel (max. 13 parametrov)
- prenos výsledkov do počítača
- zabudovaná tlačiareň
- laboratórna presnosť výsledkov

široká ponuka meraných parametrov:

TP • ALB • T-BIL • D-BIL • ALT • AST • GMT • ALP • CK • CK-MB • LDH • TG • CHOL
HDL • GLU • HCT • AMY • CREA • UREA • UA • CO2 • Ca • P • K • Na • Mg • Cl

Standard Q COVID-19 Ag Nasal

celosvetovo najpoužívanejší antigénový test

- test účinne zachytáva aj všetky známe varianty vrátane Delta a Omicron
- výsledok do 15 minút
- balenie: 25 testov
- klinicky testovaný na renomovaných pracoviskách
- predplnené extrakčné skúmavky - zjednodušujú a urýchľujú testovanie



NINONASAL®

certifikovaný francúzsky samodiagnostický nazálny antigénový test

- test účinne zachytáva aj všetky známe varianty vrátane Delta a Omicron
- jednoduchý bezbolestný výter z nosa
- balenie: 1 test v kartónovej krabičke
- výsledok do 15 minút
- EU kvalita – vyvinutý a vyrobený vo Francúzsku
- špecifita: 99%
- citlivosť: 98%



13:30 - 14:30 **„Budúcnosť bez dymu“**

Salónik Kristal

Workshop podporený spoločnosťou Philip Morris

Predstavenie projektu „Budúcnosť bez dymu“ a smerovanie spoločnosti PMI. Lekárom prvého kontaktu pomôžeme orientovať sa v kategóriách nikotinových výrobkov a ich možných dopadoch na zdravotný stav užívateľov. V druhej prednáške predstavíme praktické skúsenosti z ambulancie prvého kontaktu s prechodom od fajčenia na užívanie alternatív a oboznámime lekárov s Metodickým postupom VLD s fajčiarmi, platným v ČR..

Kapacita: 25 - 30 osôb

14:40 - 15:40 **KOMUNITNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY A TELEMEDICÍNA – HĽADÁME NOVÉ RIŠENIA STARÝCH PROBLÉMOV**

Abstrakt č. 51

Salónik Kristal

Komunita je zdrojom motivácie a praktickej pomoci v aktívnom životnom štýle. Predstavíme inovatívne rehabilitačné e-paličky pre nordic walking a jedinečné možnosti telemedicíny pri šiti liečby na mieru špecialistom kardiológom.

15:50 - 16:50 **POWERFUL MEDICAL**
Klinický asistent na báze umelej inteligencie pre efektívnu diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení

Salónik Kristal

PMcardio: Umelá inteligencia na primárnu diagnostiku EKG a adekvátny manažment kardiovaskulárnych pacientov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti

17:00 - 18:00 **SLEDOVANIE HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTOV U PL**

Salónik Kristal

Blok OZ Lymfoma

- Sledovanie hematoonkologického pacienta v ambulancii všeobecného lekára – úskalia súčasnej doby
S. Pavúková (Bratislava)

Mala som pevnú vôľu
vybudovať si firmu.
Ale s redukciov
a udrzaním si
telesnej hmotnosti
potrebujem pomoc.

Obezita je **choroba**¹

Literatúra:

1. Fábryová L et al. Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku, 2021. <http://www.mzsr.sk/Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve>

SOFIA, konzultantka;
Vek: 40 BMI: 33

Skrátená informácia o lieku:

Názov lieku: Saxenda® 6 mg/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere. **Liečivo:** liraglutid. **Lieková forma:** injekčný roztok naplnený v injekčnom pere. **Terapeutické indikácie:** Dospelí Saxenda® je určená na použitie ako doplnok k redukčnej diéte a zvýšenej fyzickej aktivite pri regulácii telesnej hmotnosti u dospelých pacientov s východiskovým indexom telesnej hmotnosti (BMI): $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ (obezita) alebo $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ (nad váha) pri súčasnom výskyte komorbidít, ako je dysglykémia (prediabetes alebo diabetes 2. typu), hypertenzia, dyslipidémia alebo obštrukčné spánkové apnoe. **Dospievajúci (≥ 12 rokov):** Saxenda® sa môže používať ako doplnok zdravej výživy a zvýšenej fyzickej aktivity pri regulácii hmotnosti u dospievajúcich pacientov vo veku od 12 rokov a starších s obezitou (BMI zodpovedajúci $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ pre dospelých podľa medzinárodných hraničných bodov) a telesnou hmotnosťou nad 60 kg. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Dospelí: úvodná dávka je 0,6 mg jedenkrát denne. Táto dávka sa má zvyšovať až na hodnotu 3,0 mg jedenkrát denne, pridávaním po 0,6 mg v minimálne jednotýždňových intervaloch, na zlepšenie gastrointestinálnej tolerance. Dávky vyššie ako 3,0 mg denne sa neodporúčajú. **Dospievajúci (≥ 12 rokov):** U dospievajúcich vo veku od 12 do 18 rokov sa má používať podobný postup navyšovania dávky ako u dospelých. Dávka sa má navyšovať až do dosiahnutia 3,0 mg (udržiavacia dávka) alebo do dosiahnutia maximálnej tolerovanej dávky. Denné dávky vyššie ako 3,0 mg sa neodporúčajú. Saxenda® sa nemá používať v kombinácii s inými agonistami GLP-1 receptora. Pri začatí liečby liekom Saxenda®, sa má zistiť mierenie dávky súbežne podávaného inzulínu alebo stimulantov tvorby inzulínu (napr. sulfonylurea), aby sa znížilo riziko hypoglykémie. Dávku nie je potrebné upravovať podľa veku. Nie je potrebná úprava dávky u pacientov s miernou alebo strednou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu $\geq 30 \text{ ml/min}$). Používanie lieku Saxenda® sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu $\leq 30 \text{ ml/min}$) vrátane pacientov s terminálnym štádiom renálneho ochorenia. Neodporúča sa úprava dávky u pacientov s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Používanie lieku Saxenda® sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a opatrnosť je potrebná u pacientov s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Nie je potrebná úprava dávky u dospievajúcich vo veku od 12 rokov a starších. Saxenda® je určená len na subkutánne použitie. Nesmie sa podávať intravenózne alebo intramuskulárne. Saxenda® sa podáva jedenkrát denne v akomkoľvek čase, nezávisle od jedla. Môže sa aplikovať do oblasti brucha, stehna alebo nadlaktia. Miesto podávania injekcie a čas podávania sa môže meniť bez úpravy dávky, avšak je vhodné, keď sa podáva približne v rovnakom čase dňa, ktorý bol zvolený ako najvhodnejší čas dňa. **Kontraindikácie:** Predchádzajúce použitie lieku Saxenda® alebo iných liekov z triedy IV, a preto sa používanie liraglutidu u týchto pacientov neodporúča. Bezpečnosť a účinnosť liraglutidu pri regulácii telesnej hmotnosti neboli sledované u pacientov vo veku 75 rokov alebo starších, liečených inými liekmi na reguláciu telesnej hmotnosti, s obezitou ako druhým príznakom endokrinného ochorenia alebo poruchami príjmu potravy alebo pri užívaní liekov, ktoré môžu spôsobiť nárast telesnej hmotnosti, so závažnou poruchou funkcie obličiek, so závažnou poruchou funkcie pečene. Použitie u týchto pacientov sa preto neodporúča. Používanie liraglutidu u pacientov so zápalovým ochorením čriev a diabetickou gastroparézou sa neodporúča. Akútna pankreatitída bola pozorovaná pri používaní agonistov GLP-1 receptora. Pacienti majú byť informovaní o typických príznakoch akútnej pankreatitídy. V prípade podozrenia na pankreatitídu sa má liraglutid vysadiť, ak sa akútna pankreatitída potvrdí, liraglutid sa nemá znovu používať. V klinických štúdiách zameraných na reguláciu telesnej hmotnosti bola pozorovaná vyššia miera cholelitiázy a cholelitiídy u pacientov liečených liraglutidom. Cholelitiáza a cholelitiída môžu viesť k hospitalizácii a cholelitiídy k cholelitiíde. Pacienti majú byť informovaní o typických príznakoch cholelitiázy a cholelitiídy. Liraglutid sa má používať opatrne u pacientov s ochorením štítnej žľazy. Ispov. frekvencia má byť monitorovaná v pravidelných intervaloch v súlade so zaznamenanou klinickou pravou. Pacienti majú byť informovaní o príznakoch zvýšenej tepovej frekvencie (bušenie srdca alebo pocit veľkej rýchlosti srdca v pokoji). U pacientov s klinicky významným trvalým zvýšením tepovej frekvencie v pokoji sa má liečba liraglutidom ukončiť. Pacienti liečení liraglutidom majú byť poučení o potenciálnom riziku dehydratácie v súvislosti s gastrointestinálnymi vedľajšími účinkami a majú vykonať preventívne opatrenia, aby zabránili strate tekutín. U pacientov s diabetom 2. typu používajúcich liraglutid v kombinácii s inzulínom alebo so sulfonylureou môže byť zvýšené riziko hypoglykémie. Saxenda® sa nesmie používať u pacientov s diabetom mellitus ako náhrada inzulínu. U pacientov závažných od inzulínu bola po náhlym prerušení podávania alebo znížení dávky inzulínu hlásená diabetická ketoacidóza. **Liekové a iné interakcie:** Po začatí liečby liraglutidom sa u pacientov liečených warfarinom alebo inými kumarínovými derivátmi odporúča častejšie sledovanie INR (International Normalised Ratio). Pri súbežnom podávaní paracetamolu sa nevyžaduje žiadna úprava dávky. Nie je potrebná žiadna úprava dávky atrovastatínu pri jeho podávaní s liraglutidom. Úpravy dávok griseofulvínu a iných zložiek s nízkou rozpustnosťou a vysokou priepustnosťou nie sú potrebné. Nie je potrebná žiadna úprava dávky digoxínu a lizinoprilu. Predpokladá sa, že antikoncepcijny účinok nie je ovplyvnený spoločným podávaním s liraglutidom. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Liraglutid sa nemá používať počas gravidity. Ak si pacientka želá otehotnieť alebo otehotnie, liečba liraglutidom sa má prestať. Nie je známe, či sa liraglutid vylučuje do ľudského materského mlieka. Pre nedostatok skúseností sa Saxenda® nemá používať počas dojčenia. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na fertilitu. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** Saxenda® nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Závraty sa však môžu vyskytnúť najmä počas prvých 3 mesiacov liečby. Ak sa vyskytnú závraty, vedenie vozidla a obsluha strojov sa má vykonať s opatrnosťou. **Nežiaduce účinky:** Veľmi časté: bolesť hlavy, nauzea, vracanie, hnačka, zápcha. Časté: hypoglykémia, nespavosť, závrat, porucha chuti, pociť suchých úst, dyspepsia, astória, gastroezofageálny reflux, bolesť v nadbrušku, nadúvanie, grganie, abdominálna distenzia, cholelitiáza, reakcie v mieste podávania injekcie, asténia, únava, zvýšená hladina lipazy, zvýšená hladina amylázy. **Menej časté:** dehydratácia, tachykardia, pankreatída, oneskorené vyprázdnovanie žalúdka, cholelitiída, urtikária, malátnosť. **Zriedkavé:** anafylaktická reakcia, akútne zvýšenie obličiek, porucha funkcie obličiek. **Zabíjanie lieku podľa spôsobu vydania:** Výdaj lieku je viazaný na lekárske predpis. **Dátum revízie textu:** december 2021. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Novo Nordisk A/S, DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky <http://www.ema.europa.eu> alebo na dôležitej adrese spoločnosti.

Piatok 14. 10. 2022

Dámsky Salónik

9:10 – 10:40 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV

Neodkladné stavy v ambulancii praktického lekára, aktuálne novinky v resuscitácii ERC 2021, resuscitácia s povinným resuscitačným vybavením, kyslíková liečba pri resuscitácii, supraglotické pomôcky, externý defibrilátor

- nácvik resuscitácie s použitím automatického externého defibrilátora a resuscitačného setu
- nácvik zabezpečenia dýchacích ciest supraglotickými pomôckami
- ukážka a správne použitie povinnej resuscitačnej výbavy ambulancie
- nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest
- nácvik zastavenia tepnového krvácania

Kapacita: 25 – 30 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Dámsky Salónik

10:50 – 12:30 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV

Kapacita: 25 – 30 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Dámsky Salónik

13:30 – 15:00 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV

Kapacita: 25 – 30 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Piatok 14. 10. 2022

Salónik Gold

9:10 – 10:10 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Praktický postup krátkej intervencie v regulácii hmotnosti
Meranie prístrojom ZYTO BALANCE
Názorná ukážka potravín s vysokou energetickou hodnotou

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Salónik Gold

10:20 – 11:20 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Salónik Gold

11:30 – 12:30 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Salónik Gold

13:30 – 14:30 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Salónik Gold

14:40 – 15:40 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Salónik Gold

15:50 – 16:50 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Salónik Gold

17:00 – 18:00 TVOJA AMBULANCIA ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB

Nový spôsob poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti združením právnických osôb. S využitím integrácie ambulantného informačného systému a jednotnej telekomunikačnej platformy.
Sme skúsení, inovatívni a využívame najnovšie technológie.



Pret že nám záleží

Triplixam

Zloženie*: Triplixam 5mg/1,25mg/5mg filmom obalená tableta obsahuje: 5 mg perindoprilu arginínu (per)/1,25 mg indapamidu (ind)/5 mg amlodipínu (amlo); Triplixam 5mg/1,25mg/10mg filmom obalená tableta: 5 mg per/1,25 mg ind/10 mg amlo; Triplixam 10mg/2,5mg/5mg filmom obalená tableta: 10 mg per/2,5 mg ind/5 mg amlo; Triplixam 10mg/2,5mg/10mg filmom obalená tableta: 10 mg per/2,5 mg ind/10 mg amlo. **Indikácie*:** Substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní kombináciou fixnej dávky perindoprilu/indapamidu a amlodipínu, podávanými v rovnakých dávkach. **Dávkovanie a spôsob podávania*:** Jedna tableta denne, prednostne ráno a pred jedlom. Kombinácia fixných dávok nie je vhodná ako začiatková terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s jednotlivými zložkami. **Pediatrická populácia:** nemá sa používať. **Kontraindikácie*:** Pacienti na dialýze. Pacienti s neliečeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním. Ťažká porucha funkcie obličiek (Cl_{cr} < 30 ml/min). Stredne ťažká porucha funkcie obličiek (Cl_{cr} 30 – 60 ml/min) pre Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg a 10 mg/2,5 mg/10 mg. Predlivelnosť na liečbu alebo na iné sulfonamidy, na dihydropridínové deriváty, na akýkoľvek iný inhibitor ACE alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Anamnéza angioedému (Quinkeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibitorom ACE (pozri časť Upozornenia). Hereditárny/idiopatický angioedém. Druhý a tretí trimester gravidity (kvôli riziku fetopatie a Gravidita a Gravidita). Hepatálna encefalopatia. Ťažká porucha funkcie pečene. Hypokaliémia. Ťažká hypotenzia. Sok vrátane kardiogénneho šoku. Obštrukcia výtokovej časti ľavej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy). Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu. Súbežné použitie Triplixamu s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetom mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m²) (pozri časť Interakcie), súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom - liečba liekom Triplixam sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu (pozri časť Upozornenia a Interakcie), extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť Interakcie), významná bilaterálna stenóza renálnych artérií alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť Upozornenia). **Upozornenia*:** Osobitné upozornenia: *Dvojnásobná inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS):* Inhibitor ACE a blokátory recep-

torov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou. *Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia:* opatnosť v prípade kolagenového vaskulárneho ochorenia, imunosupresívnej liečby, liečby allopurinolom alebo prokainamidom, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä v prípade už existujúcej poruchy funkcie obličiek. Monitorovanie počtu leukocytov. *Renovaskulárna hypertenzia:* zvýšené riziko hypotenzie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie. *Predlivelnosť/angioedém, intestinálny angioedém:* zastaviť liečbu a monitorovať do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom (kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému). Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie ACE inhibitorov s NEP inhibitorami (napr. rasekadotril), mTOR inhibitorami (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) a gliptínmi (napr. linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín) viedť k zvýšenému riziku angioedému (napr. opuch dýchacích ciest alebo jazyka, s poruchou dýchania alebo bez nej) (pozri časť INTERAKCIE*). Pri začatí liečby rasekadotrilom, inhibítormi mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) a gliptínmi (napr. linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín) u pacientov, ktorí už užívajú ACE inhibitor, je potrebná opatnosť. *Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:* opatnosť u alergických pacientov liečených desenzibilizáciou a vyhnúť sa pri imunoterapii jedlom. Dočasne prerušiť podávanie inhibítora ACE najmenej 24 hodín pred liečbou. *Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy:* dočasné vysadenie liečby inhibítormi ACE pred každou aferézou. *Hemodialyzovaní pacienti:* zväčšiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inej skupiny antihypertenzív. *Primárny aldosteronizmus:* užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému). *Gravidita:* nezačínať počas gravidity, zastaviť liečbu a začať alternatívnu liečbu, ak je to vhodné. *Hepatálna encefalopatia, ktorá môže predchádzať do hepatálnej kómy:* ukončiť liečbu. *Fotosenzitivita:* zastaviť liečbu. *Opätrenia pri používaní:* Funkcia obličiek: U niektorých hypertenzných pacientov bez predošlých zjavných obličkových lézií a u ktorých renálne krvné testy potvrdzujú funkčnú renálnu insuficienciu, sa má liečbu ukončiť a ak je to možné, znova začať, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku. Monitorovanie draslíka a kreatinínu, po dvoch týždňoch liečby a potom každé dva mesiace počas obdobia terapeutickú stabilizácie. V prípade bilaterálnej stenózy renálnych artérií alebo pri jednej funkčnej obličky: neodporúča sa. Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo renálnej insuficencie (v prípade srdcovej insuficencie, depície vody a elektrolytov u pacientov s nízkym krvným tlakom, stenózou renálnej artérie, kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo cirhózou s edémom a ascitom): začať liečbu s nižšou dávkou a postupne zvyšovať. *Hypotenzia a depícia vody a sodíka:* Riziko náhle hypotenzie v prípade už existujúcej depície sodíka (najmä v prípade stenózy renálnej artérie): Monitorovanie plazmatických elektrolytov, opätovné dosiahnutie krvného objemu a krvného tlaku, znova začať liečbu, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku. Hladiny sodíka: Častejšie monitorovanie u starších a u cirhotických pacientov. *Hladiny draslíka:* Hyperkaliémia: monitorovať hladiny draslíka v plazme v prípade renálnej insuficencie, zhoršenia funkcie obličiek, veku (> 70 rokov), diabetu mellitus, pridružených udalostí, obzvlášť dehydratácie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidozy a súbežného užívania draslík šetriacich diuretik, doplnkov draslíka alebo solných náhrad s obsahom draslíka; alebo iných liekov spôsobujúcich zvýšenie hladín draslíka v sére a majú antagonizovať aldosterónu alebo blokátory angiotenzínových receptorov. Hypokaliémia: vysoké riziko u starších a/alebo podvyživených osôb, cirhotických pacientov s edémom a ascitom, pacientov s ochorením koronárnych artérií, pacientov so zlyhaním obličiek alebo so srdcovým zlyhaním, s dlhým QT intervalom: monitorovanie draslíka v plazme. Môže spôsobiť svalové poruchy, a v súvislosti so závažnou hypokaliémiou boli hlásené prípady rabdomyolýzy. Môže podporiť vznik *torsades de pointes*, ktoré môžu byť fatálne. *Hladiny vápnika:* hyperkaliémia: ukončiť liečbu pred vyšetrením funkcie prísťných teliesok. *Renovaskulárna hypertenzia:* v prípade stenózy renálnej artérie: začať liečbu v nemocničnom zariadení s nízkou dávkou; monitorovať funkcie obličiek a draslík. *Suchý kašeľ.* *At-eroskleróza:* začať liečbu s nízkou dávkou u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrálnou cirkulačnou insuficienciou. *Hypertenzná kríza.* *Srdcové zlyhanie/závažná srdcová nedostatočnosť:* Opatnosť v prípade srdcového zlyhania. *Závažná srdcová nedostatočnosť (stupeň IV):* začať liečbu pod lekárom dohľadom so zníženou začiatkovou dávkou. *Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertroická kardiomyopatia:* Opatnosť v prípade obštrukcie výtokovej časti ľavej komory. *Diabetickí pacienti:* U pacientov s inzulin dependentným diabetom mellitus sa má liečba začať pod lekárom dohľadom so zníženou úvodnou dávkou; monitorovať hladiny glukózy počas prvého mesiaca a/alebo v prípade hypokaliémie. *Čierna rasa:* vyšší výskyt angioedému a zjavne nižšia účinnosť v znižovaní krvného tlaku ako u pacientov iných rás. *Operácia/anestézia:* prerušiť liečbu jeden deň pred operáciou. *Porucha funkcie pečene:* Mierne až stredne ťažká: opatnosť. Zriedkavo boli inhibitory ACE spojené so syndrómom, ktorý začína cholestatickou žltáčkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy a (niekedy) úmrtia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltáčka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov. *Kyselina močová:* hyperurikémia: Zvýšená tendencia k zachvatom dny. *Staršie osoby:* vyšetriť funkcie obličiek a hladiny draslíka pred začatím liečby. Dávku zvyšovať s opatnosťou. *Pomocné látky:* zanedbateľné množstvo sodíka. *Sportovci:* môže spôsobiť pozitívnu reakciu dopingových testov. *Charoáidna efúzia, akútna myopia a sekundárny glaukóm so zatvoreným uhlom:* prerušiť užívanie lieku tak rýchlo, ako je to možné. Ak vnútroočný tlak ostáva nekontrolovaný, môže byť potrebné zväčšiť rýchlosť lekárskej alebo operačnej liečby. **Interakcie*:** Kontraindikované: Aliskiren u diabetikov a pacientov s poruchou funkcie obličiek, extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan. *Neodporúča sa:* Litium, aliskiren u pacientov iných ako sú diabetickí pacienti a pacienti s poruchou funkcie obličiek, súbežná liečba s inhibítormi ACE a blokátormi angiotenzínového receptora, estramustin, draslík šetriace lieky (napr. triamterén, amilorid...), dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. *Osobitná starostlivosť:* Baklofen, nesteroidné protizápalové lieky (vrátane kyseliny acetylsalicylovej vo vysokých dávkach), antiidiabetiká (inzulín, hypoglykemizujúce lieky), draslík šetriace diuretiká a draslík šetriace diuretiká (epifenon, spironolaktón), rasekadotril, mTOR inhibitory (sirolimus, everolimus, temsirolimus), lieky vyvolávajúce *torsades de pointes*, amfetorin B (i.v. podanie), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakosaktid, stimulačné laxatíva, kardioglykozidy, allopurinol, CYP3A4 indukto, CYP3A4 inhibitory. *Treba vziať do úvahy:* Imipramínové anti-depresíva (tricyklické), neuroleptiká, iné antihypertenzíva a vazodilatancia, tetrakosaktid, allopurinol, cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikoidy alebo prokainamid, anestetiká, diuretiká (ťažidlové alebo slučkové diuretiká), gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), sympatomimetiká, zlato, metformín, jódované kontrastné látky, vápnik (solí), cyklosporín, atorvastatín, digoxín, warfarín, takrolimus, simvastatín. *Látky indukujúce hyperkaliémiu:* aliskiren, soli draslíka, draslík šetriace diuretiká, ACE inhibitory, antagonizujúce receptory angiotenzínu II, NSAID, heparíny, imunosupresíva, ako cyklosporín alebo takrolimus, trimetoprim a kotrimoxazol (trimetoprim /sulfametoxazol). **Gravidita a laktácia*:** Kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Neodporúča sa počas prvého trimestra gravidity a počas laktácie. **Fertilita*:** Reverzibilné biochemické zmeny na hlavičke spermii u niektorých pacientov liečených blokátormi kalciových kanálov. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje*:** Môže byť znížená kvôli nízkemu krvnému tlaku, ktorý sa môže vyskytnúť u niektorých pacientov, najmä na začiatku liečby. **Nežiaduce účinky*:** Veľmi časté: edém. Časté: závraty, bolesť hlavy, parestézia, vertigo, somnolencia, dysgeúzia, porucha videnia, diplopia, tinitus, palpitácie, hypotenzia (a účinky spojené s hypotenziou), depícia draslíka a hypokaliémia, závažná najmä u vysokorizikovej populácie**, kašeľ, dyspnoe, bolesť brucha, zápcha, hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie, zmena činnosti čriev, svrbenie, vyrážka, makulopapulárna vyrážka, svalové spazmy, opuch členkov, asténia, únava. *Menšie časté:* rinítida, ezoinfúzia, hypersenzitivita, hypoglykémia, hyperkaliémia, reverzibilná po vysadení, hyponatriémia, insomnia, zmeny nálad (vrátane úzkosti), depresia, poruchy spánku, hypotenzia, tremor, synkopa, tachykardia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fibrilácie), vaskulitída, bronchospazmus, suchosť v ústach, urtikária, angioedém, alopecia, purpura, zmeny sfarbenia kože, hyperhidróza, exantém, fotosenzitivné reakcie, pemfigoid, artralgia, myalgia, bolesť svalov, poruchy močenia, noktüria, polakizúria, zlyhanie obličiek, erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť, bolesť na hrudi, nevoľnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hmotnosť, znížená hmotnosť, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, pád. *Zriedkavé:* akútne obličkové zlyhanie**, syndróm neprimeranej sekrecie antiidiuretického hormónu (SIADH, Syndróm of inappropriate antiidiuretic hormone secretion)**, anúria/oligúria**, začervenanie**, hypochlorémia**, hypomagneziémia**, stav zmätenosti, zvýšená hladina bilirubínu v krvi, zvýšená hladina hepatálnych enzýmov, zhoršenie psoriázy. *Veľmi zriedkavé:* agranulocytóza, aplastická anémia, pancytopenia, leukopénia, neutropénia, hemolytická anémia, trombocytopénia, alergické reakcie, hyperglykémia, hyperkaliémia, hypertónia, periférna neuropatia, mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, angína pectoris, infarkt myokardu, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, ezoinfúlna pneumónia, hyperplázia dasien, pankreatitída, gastritída, hepatitída, žltáčka, abnormálna funkcia pečene, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, exfoliatívna dermatitída, toxická epidermálna nekrolýza, Quinkeho edém, akútne zlyhanie obličiek, zníženie hemoglobínu a hematokritu. *Neznáme:* Extrapiramidová porucha (extrapyramidový syndróm), myopia, rozmazané videnie, akútny glaukóm s uzavretým uhlom, choroidálna efúzia, *torsades de pointes* (potenciálne smrteľné), rabdomyolýza, možnosť nástupu hepatálnej encefalopatie v prípade hepatálnej insuficencie, možné zhoršenie už existujúceho systémového lupus erythematosus, predĺžený interval QT na elektrokarдиограме, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi, Raynaudov fenomén. **Predávkovanie*.** **Vlastnosti*:** Perindopril je inhibitor angiotenzínu konvertujúceho enzýmu (inhibitor ACE), ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II. Indapamid je sulfonamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný s ťiazidovou skupinou diuretik. Amlodipín je inhibitor vstupu kalciových iónov z dihydropridínovej skupiny (blokátor pomalejšieho kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do srdcového svalstva a hladkých svalov ciev. **Balenie*:** 30 alebo 90 tabliet. **Dátum revízie textu:** 06/2022. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 68, 03-236 Warszawa, Poľsko

* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adresu miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, www.servier.sk

** Všimnite si, prosím, zmenu v informácii o lieku

Materiál je určený výlučne pre osoby oprávnené predpisovať alebo vydávať liek. Dátum prípravy materiálu: September 2022.

Literatúra: 1. Toth K et al. PIANIST Investigators. Am J Cardiovasc Drugs. 2014;14:137–145 2. Mareev V et al. Kardiologija. 2020;60 (5):1149 3. Chalmers J, Arima H, Woodward M et al. Hypertension 2014;63:259–264

Piatok 14. 10. 2022

9:10 – 10:10

TERAPIA POHYBOM

M. Rafajdus – Katedra verejného zdravotníctva,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Workshop podporený spoločnosťou KRKA

Ako doceliť správne vyvážené pohybové návyky a zlepšiť pohybovú gramotnosť.
Príďte sa naučiť a pocítiť sami na sebe správne pohybové vnemy ktoré vedú
k ozdravnému procesu.

Workshop vychádza z odborných skúsenosti v špecializovaných metódach:
Spiraldynamik, Metodológia Miroslava Tichého, cvičenie SM- systém, metóda TRE,
Aplikovaná kineziológia.

Kapacita: 6 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Telocvičňa

11:30 – 12:30

TERAPIA POHYBOM

M. Rafajdus – Katedra verejného zdravotníctva,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Workshop podporený spoločnosťou KRKA

Kapacita: 6 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Telocvičňa

13:30 – 14:30

ŠKOLA CHRBTÁ – plus

E. Dúbravová

Workshopom chceme nadviazať na predchádzajúce roky keď mali praktickí lekári
možnosť prejsť si „školou chrbta“. Tá ostáva štandardom v liečbe a hlavne prevencii
bolestí pohybového aparátu.

Okrem toho ako si od bolesti môžeme pomôcť škola chrbta tiež učí porozumieť ako
bolesť chrbta, resp. v pohybovom aparáte vzniká.

Príčinou väčšiny bolestivých stavov sú funkčné poruchy.

Výuka, pochopenie základov myoskeletálnej medicíny je v našom zdravotníckom
systéme nekonceptná. Pritom praktický lekár zohráva v diagnostike a liečbe
vertebrogénnych ochorení dôležité miesto.

Ako teda diagnostikovať pohybové funkcie? Ako postupovať, čo poradiť pacientovi,
ktorý sa vracia na ambulanciu s bolesťami chrbta či pohybovej štruktúry?

Kapacita: 30 osôb

Telocvičňa

14:40 – 15:40

TERAPIA POHYBOM

M. Rafajdus – Katedra verejného zdravotníctva,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Workshop podporený spoločnosťou KRKA

Kapacita: 6 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Telocvičňa

15:50 – 16:50

ŠKOLA CHRBTÁ – plus

E. Dúbravová

Kapacita: 30 osôb

Telocvičňa

17:00 – 18:00

TERAPIA POHYBOM

M. Rafajdus

Kapacita: 6 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Telocvičňa

Sobota 15. 10. 2022

9:40 – 10:40

ŠKOLA CHRBTÁ – plus

E. Dúbravová

Workshopom chceme nadviazať na predchádzajúce roky keď mali praktickí lekári
možnosť prejsť si „školou chrbta“. Tá ostáva štandardom v liečbe a hlavne prevencii
bolestí pohybového aparátu.

Okrem toho ako si od bolesti môžeme pomôcť škola chrbta tiež učí porozumieť ako
bolesť chrbta, resp. v pohybovom aparáte vzniká.

Príčinou väčšiny bolestivých stavov sú funkčné poruchy.

Výuka, pochopenie základov myoskeletálnej medicíny je v našom zdravotníckom
systéme nekonceptná. Pritom praktický lekár zohráva v diagnostike a liečbe
vertebrogénnych ochorení dôležité miesto.

Ako teda diagnostikovať pohybové funkcie? Ako postupovať, čo poradiť pacientovi,
ktorý sa vracia na ambulanciu s bolesťami chrbta či pohybovej štruktúry?

Kapacita: 30 osôb

Telocvičňa



43. výročná konferencia SSVPL

ĎAKUJEME PARTNEROM KONGRESU

PLATINOVÝ SPONZOR



ZLATÍ SPONZORI



STRIEBORNÍ SPONZORI



VYSTAVOVATELIA

